

Évolution de l'activité du service de réanimation de l'hôpital médico-chirurgical de Kaboul, de 2009 à 2014

Titre(s): Évolution de l'activité du service de réanimation de l'hôpital médico-chirurgical de Kaboul, de 2009 à 2014 / Sylvain Vico ; sous la direction du Professeur Stéphane Mérat

Auteur(s): Vico, Sylvain (1987-....)

Autre(s) responsabilité(s): Mérat, Stéphane (1969-....) (Directeur de thèse)
Université Paris Descartes 1970-2019 - Organisme de soutenance
Université Paris Descartes, Faculté de médecine - Organisme de soutenance
Université Paris 13 - 985
École du Val-de-Grâce - 985

Editeur, producteur: 2016

Description matérielle: 1 vol. (91 f.) : ill. ; 30 cm

Note sur l'exemplaire: Version électronique disponible au format pdf (BCSSA)

Note sur les bibliographies et les index: Bibliogr. f. 80-83 (59 réf.)

Note de thèses et écrits académiques: Thèse d'exercice Médecine 2016 Paris 5

Résumé ou extrait: Introduction : Suite aux attentats du 11 novembre 2001, la France s'est engagée aux côtés des Etats-Unis et de l'OTAN dans une guerre contre les talibans en Afghanistan, de 2001 à 2014. La France annonce le retrait progressif de ses troupes en janvier 2012. Ce retrait sera effectif à compter de juin 2012. L'hôpital médico-chirurgical de KaIA, structure de soins de rôle 3, est placé sous commandement français en mars 2010. La vocation principale de cet hôpital est de prendre en charge les militaires blessés de l'OTAN. L'intérêt est donc d'évaluer l'évolution de l'activité de la réanimation de cet hôpital, avant et après l'annonce du retrait des troupes françaises. Matériels et méthodes : Il s'agit d'une étude quantitative, observationnelle, rétrospective, descriptive et longitudinale. Nous avons comparé l'activité de la réanimation de l'hôpital médico-chirurgical de KaIA sur deux périodes : la première de novembre 2009 à juin 2012 et la deuxième de juillet 2012 à janvier 2014. Pour cela nous avons comparé : activité globale (nombre d'admissions mensuelles), âge et sexe des patients, nationalité, statut, motifs d'admissions, durée moyenne de séjour et modes de sortie. Les critères d'inclusion étaient : tout patient vivant admis en réanimation sur la période susmentionnée. Résultats : Sur l'ensemble de la période de notre étude, 842 admissions ont été effectuées en réanimation. Durant la seconde période de l'étude, l'activité globale a diminué avec un nombre d'admissions mensuelles de 13 (+/-6,12), comparé à 18,6 (+/-5,47) pendant la seconde période ($p=0,0014$). Par ailleurs, la proportion de patients de sexe masculin a diminué de la première à la deuxième période (87,41% puis 80,07%, $p=0,01$). De la première à la deuxième période, la proportion de patients civils a augmenté de 63,22% à 79,78% (p