

Comparaison de deux tests de dépistage primaire de l'addiction au sport

Titre(s) : Comparaison de deux tests de dépistage primaire de l'addiction au sport : EDS-R et EAI : étude dans les armées / Jérémy Guichard ; sous la direction de Sandra Winter

Est reproduit comme : Comparaison de deux tests de dépistage primaire de l'addiction au sport

Auteur(s) : Guichard, Jérémy (1989-....)

Autre(s) responsabilité(s) : Winter, Sandra (1985-....) (Directeur de thèse)
Université Claude Bernard Lyon - Organisme de soutenance

Editeur, producteur : 2017

Description matérielle : 1 vol. (59 f.) : ill. ; 30 cm

Note sur le titre et les responsabilités : EDS-R = Exercise dependence scale-revisited
EAI = Exercise addiction inventory

Note sur l'exemplaire : Version électronique disponible au format pdf (BCSSA)

Note sur les bibliographies et les index : Bibliogr. f. 52-56

Note de thèses et écrits académiques : Thèse d'exercice Médecine 2017 Lyon 1

Résumé ou extrait : Le sport est indissociable de la qualité de militaire. En revanche il entraîne de nombreuses blessures. Les militaires blessés, s'ils sont addicts, ont plus de difficultés à reprendre le travail et à se soigner efficacement. Il existe pour le moment un seul test de dépistage l'EDS-R, fastidieux à remplir. Un nouveau test, l'EAI est apparu plus rapide. L'objectif principal est donc de comparer l'efficacité dans le dépistage des personnels addicts au sport avec les deux tests. Le recueil anonyme des données a pu être effectué pendant un semestre sur plusieurs unités en entretien individuel comme en groupe, les deux méthodes étant validées pour les deux tests. 568 personnels ont été inclus. 3% des personnels étaient addicts selon le test EDS-R, tout comme avec le test EAI. En revanche, le coefficient de concordance kappa calculé selon la méthode de Mc Nemar n'est pas bon que ce soit dans le dépistage des sujets addicts (0.345) comme dans celui des sujets simplement à risque (0.305). Le trait le plus représenté chez les addicts selon EDS-R est l'augmentation de la tolérance à l'effort que l'on pourrait rapprocher du phénomène d'accoutumance. Dans le test EAI, le trait le plus représenté chez les addicts est la recherche de l'expérience ressentie. Les deux tests ne testent pas les mêmes critères car chaque test correspond à une théorie de l'addiction différente. De plus, les tests permettent de dépister un risque d'addiction, le diagnostic n'étant porté qu'en consultation de psychiatrie. Ils seraient donc intéressants de voir parmi les sujets dépistés positifs le nombre de Faux Positifs dans cette population

Sujet - Nom commun : Bigorexie -- Dépistage -- Thèses et écrits académiques
Médecine du sport -- Thèses et écrits académiques

Médecine militaire -- Thèses et écrits académiques