

Prise en charge des infections sexuellement transmissibles par les médecins militaires au sein de l'Armée française : évaluation des pratiques et élaboration d'un chemin clinique

Type de contenu : Texte

Type de médiation : b

Type de support : Ressource dématérialisée

Titre(s) : Prise en charge des infections sexuellement transmissibles par les médecins militaires au sein de l'Armée française : évaluation des pratiques et élaboration d'un chemin clinique / Romane Zech ; sous la direction de Aude Valois

Est reproduit comme : Prise en charge des infections sexuellement transmissibles par les médecins militaires au sein de l'Armée française : évaluation des pratiques et élaboration d'un chemin clinique Romane Zech 2020 1 vol. (44 f.)

Auteur(s) : Zech, Romane (1994-....)

Autre(s) auteur(s) : Valois, Aude (1985-....)

Aix-Marseille Université 2012-....

Aix-Marseille Université Faculté de médecine 2012-2018

Production : 2020

Note(s) : Présentée sous la forme d'une thèse-article

Note sur le titre et les responsabilités : Titre provenant de l'écran-titre

Note de thèses et écrits académiques : Thèse d'exercice Médecine. Médecine générale Aix-Marseille 2020
Mémoire de DES Médecine. Médecine générale Aix-Marseille 2020

Résumé ou extrait : Introduction : les infections sexuellement transmissibles sont fréquentes dans l'armée. L'objectif de notre étude est d'évaluer leur prise en charge par un échantillon de médecins militaires et d'établir un chemin clinique en accord avec les recommandations officielles. Matériel et méthode : une étude descriptive multicentrique rétrospective a été réalisée, basée sur l'analyse de dossiers médicaux. Etaient inclus les militaires ayant eu une infection sexuellement transmissible entre 2016 et 2018 au sein des unités de l'aire toulonnaise. Les données ont été comparées aux recommandations officielles, puis un chemin clinique a été établi. Résultats : la population analysée comprenait 1 femme et 95 hommes. Le dépistage des infections associées était effectué correctement dans 83,3% des cas. Le traitement était conforme aux recommandations dans plus de 75% des cas. Parmi les patients nécessitant un suivi clinique, 47,4% ne revoyaient pas leur médecin. Les partenaires n'étaient pas dépistés dans 55,2% des cas. La déclaration épidémiologique n'était pas effectuée dans plus de 80% des cas. Conclusion : une

amélioration de la prise en charge est souhaitable concernant le prélèvement initial, les posologies du traitement, le dépistage des partenaires, le suivi des patients et la déclaration épidémiologique. Un chemin clinique a été élaboré dans ce sens.

Configuration requise : un logiciel capable de lire un fichier au format : PDF

Sujet - Nom commun : Infections sexuellement transmissibles -- Diagnostic
Médecins militaires

Forme, genre ou caractéristiques physiques : Thèses et écrits académiques

Adresse électronique et mode d'accès : <https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02978650>
https://www.gedissa.org/main/document/showinframes.php?cidReq=BCSSA&id_session=0&gidReq=0&gradebook=0&origin=&id=127975