

Tentative d'approche du lien entre trouble de stress post-traumatique et conduites addictives avec et sans substance en population militaire

Type de contenu : Texte

Type de médiation : sans médiation

Type de support : Volume

Titre(s) : Tentative d'approche du lien entre trouble de stress post-traumatique et conduites addictives avec et sans substance en population militaire / Anaïs David épouse Bouchard ; sous la direction de Marianne Daudin

Auteur(s) : David, Anaïs (1987-....)

Autre(s) responsabilité(s) : Daudin, Marianne (1980-....) (Directeur de thèse)

Université Paris-Sud 1970-2019 - Organisme de soutenance

Université de Paris-Sud, Faculté de médecine Le Kremlin-Bicêtre, Val-de-Marne - Organisme de soutenance

Editeur, producteur : 2017

Description matérielle : 1 vol. (98 f.) ; 30 cm

Note sur l'exemplaire : (BCSSA) Version électronique disponible au format pdf

Note sur les bibliographies et les index : Bibliographie : 90 réf.

Note de thèses et écrits académiques : Thèse d'exercice Médecine Paris-Sud 2017

Résumé ou extrait : Introduction : Les données de la littérature montrent qu'il existe une association forte entre trouble de stress post-traumatique et conduites addictives en population générale. Les chiffres de prévalence de cette association sont plus élevés encore en population militaire étrangère, aucune étude n'ayant été réalisée jusqu'à présent en population militaire française. L'objectif principal de cette étude est de décrire les consommations de tabac, d'alcool et de cannabis, chez un groupe de militaires souffrant d'un trouble de stress post-traumatique (TSPT) suivis en psychiatrie à l'HIA Percy ou l'HIA Bégin.

Matériel et méthode : Le diagnostic de TSPT est vérifié par l'échelle PCLS. Les consommations de tabac, d'alcool et de cannabis sont évaluées par des questionnaires standardisés (Fagerström, AUDIT, CAST).

Une simple exploration des autres consommations et des addictions sans substances (jeux vidéo, jeux d'argent, sport, prises de risque et sexe) est réalisée à titre exploratoire. Résultats : 43 patients ont été inclus dans l'étude entre mai et juillet 2017 (38 hommes et 5 femmes). 44,18% des patients consomment du tabac et 52,63% des consommateurs présentent une probable dépendance à la nicotine. 37,21% de notre population présente un probable trouble d'usage de l'alcool. La prévalence de consommation du cannabis est elle plus faible (13,95%), avec un probable trouble d'usage chez 83,33% des consommateurs.

94,74% des fumeurs et 67,57% des consommateurs d'alcool décrivent une modification de leurs consommations dans les suites de l'événement traumatique. Pour une large majorité, les consommations ont augmenté. Les données concernant les consommateurs de cannabis sont difficilement interprétables du fait de la faible puissance de notre échantillon de consommateurs. Discussion : Il apparaît que la confrontation à un événement traumatique influe sur les consommations de tabac, d'alcool et de cannabis. Les liens entre addiction et TSPT apparaissent complexes. Une étude qualitative permettrait alors de mieux comprendre le vécu des patients au moment des consommations et de mieux appréhender les interactions entre clinique psychotraumatique et addictions, étude qui sera réalisée ultérieurement.

Sujet - Nom commun : Tabagisme -- Thèses et écrits académiques

Consommation d'alcool -- Thèses et écrits académiques

Cannabis -- Thèses et écrits académiques

Névroses post-traumatiques -- Thèses et écrits académiques

Syndrome posttraumatique -- Thèses et écrits académiques