

Description de la perte d'effectifs (attrition) pour raison médicale en Formation Générale Initiale de l'Armée de Terre

Type de contenu : Texte

Type de médiation : b

Type de support : Ressource dématérialisée

Titre(s) : Description de la perte d'effectifs (attrition) pour raison médicale en Formation Générale Initiale de l'Armée de Terre : étude épidémiologique descriptive, rétrospective, multicentrique menée au cours de l'année 2016 / Claire Péral ; sous la direction de Thomas Colleony

Est une reproduction de : Description de la perte d'effectifs (attrition) pour raison médicale en formation générale initiale de l'armée de terre étude épidémiologique descriptive, rétrospective, multicentrique menée au cours de l'année 2016 Claire Péral 2018 1 vol. (64 f.)

Auteur(s) : Péral, Claire (1990-....)

Autre(s) auteur(s) : Colleony, Thomas (1984-....)

Université de Lorraine

Editeur, producteur : 2018

Titre traduit ajouté par le catalogueur : Description of the loss of personnel (attrition) for medical reason in Initial General Training of the „Armée de Terre” descriptive, retrospective, multicentric epidemiological study conducted in 2016 eng

Note sur le titre et les responsabilités : Titre provenant de l'écran-titre

Note sur les bibliographies et les index : Bibliogr. p.98-106

Note de thèses et écrits académiques : Thèse d'exercice Médecine Université de Lorraine 2018

Résumé ou extrait : La perte d'effectif appelée « attrition médicale » est un réel problème dans les armées, surtout lors des premiers mois de service des personnels militaires. Pourtant l'Armée française manque de statistiques sur ce phénomène. Objectif : L'objectif de cette étude est de décrire les pathologies source de l'attrition médicale des recrues de l'Armée de Terre lors de leur formation générale initiale de douze semaines. Méthodes : Les données ont été collectées depuis les dossiers médicaux des recrues dont la formation a été arrêtée entre le 1er janvier et le 31 décembre 2016 au sein de cinq centres de formation initiale militaire. Résultats : Sur les 5785 recrues incorporées, 309 ont arrêté la formation sur décision médicale soit une attrition médicale de 5,3%. Les principales étiologies d'attrition médicale étaient les pathologies traumatiques avec 37,9% de blessures par surutilisation et 25,6% de blessure par traumatisme aigu. Les membres inférieurs étaient la structure la plus touchée par les

pathologies traumatiques avec 47,4% des localisations de blessures. Conclusion : l'attrition médicale est expliquée majoritairement par les traumatismes par surutilisation. Les blessures représentent l'élément le plus facilement modifiable pour diminuer l'attrition et préserver les effectifs. Un programme complet de prévention des blessures semblerait donc bénéfique pour l'Armée.

Configuration requise : Configuration requise : un logiciel capable de lire un fichier au format PDF

Sujet - Nom commun : Enseignement militaire

Militaires -- Démission

Sportifs -- Lésions et blessures

Forme, genre ou caractéristiques physiques : Thèses et écrits académiques

Adresse électronique et mode d'accès : http://docnum.univ-lorraine.fr/public/BUMED_T_2018_PERAL_CLAIRE.pdf

https://www.gedissa.org/main/document/document.php?cidReq=BCSSA&id_session=0&gidReq=0&grad ebook=0&origin=&action=download&id=515