

Le canal lombaire étroit chez la personne âgée de plus de 75 ans

Titre(s): Le canal lombaire étroit chez la personne âgée de plus de 75 ans : facteurs déterminants du résultat fonctionnel / Mathilde Fouet,... ; directeur et co-directeur de thèse, Pr Philippe Pernot, Pr Rémy Michel

Auteur(s): Fouet, Mathilde (1988-....)

Autre(s) responsabilité(s): Pernot, Philippe (1954-....) (Directeur de thèse)
Michel, Rémy (1967-....) (Directeur de thèse)
Université Paris Descartes 1970-2019 - Organisme de soutenance
Université Paris Descartes, Faculté de médecine - Organisme de soutenance

Editeur, producteur: [Lieu de publication inconnu] : [éditeur inconnu], 2015

Description matérielle: 1 vol. (131 p.) : ill. ; 30 cm

Titre traduit ajouté par le catalogueur: Lumbar spinal stenosis after 75 years old determinants of the functional outcome eng

Note sur l'exemplaire: Version électronique disponible au format pdf (BCSSA)

Note sur les bibliographies et les index: Bibliogr. p. 117-126

Note de thèses et écrits académiques: Thèse d'exercice Médecine 2015 Paris 5

Résumé ou extrait: Introduction : le canal lombaire étroit est une pathologie fréquente. Lorsqu'il est symptomatique, il se manifeste par une claudication radiculaire intermittente. La sténose acquise se développe préférentiellement au niveau de la jonction entre deux vertèbres par des phénomènes dégénératifs complexes associant une hypertrophie du ligament jaune, une altération des facettes articulaires, des protrusions discales et parfois un spondylolisthésis. C'est la première indication en neurochirurgie fonctionnelle rachidienne chez les personnes âgées. La population vieillissante des pays industrialisés, est accablée par de nombreuses comorbidités qui compliquent sa prise en charge. La sélection des patients éligibles à une chirurgie nécessite de connaître les enjeux d'un tel traitement et notamment les facteurs pronostiques liés à l'amélioration fonctionnelle. Objectifs : cette étude rétrospective a pour but de rechercher des déterminants du résultat fonctionnel dans la chirurgie du canal lombaire étroit chez des patients âgés de plus de 75 ans, en terme de satisfaction postopératoire. Patients et méthodes : il s'agit d'une étude rétrospective, monocentrique sur dossiers médicaux. Les patients inclus ont été opérés entre octobre 2006 et décembre 2014 d'une laminectomie lombaire et avaient au moins 75 ans lors de l'intervention. Des données démographiques, cliniques, paracliniques, thérapeutiques, chirurgicales et de suivi ont été recueillies. Résultats: soixante-treize patients ont pu être sélectionnés avec une médiane de satisfaction de 85%. Aucun patient de notre étude n'a présenté d'aggravation secondaire à la chirurgie et aucun n'est décédé. L'analyse par modèle de régression linéaire montre que la prise d'antalgiques en pré- (p