

Validation de la version française d'une échelle d'évaluation des effets secondaires liés aux psychotropes (UKU-SERS-Pat) et description des effets secondaires présents dans une population de patients militaires bénéficiants d'un traitement antidépresseur

Type de contenu : Texte

Type de médiation : b

Type de support : Ressource dématérialisée

Titre(s) : Validation de la version française d'une échelle d'évaluation des effets secondaires liés aux psychotropes (UKU-SERS-Pat) et description des effets secondaires présents dans une population de patients militaires bénéficiants d'un traitement antidépresseur / Louise Klause ; dirigée par M. le Docteur Emeric Saguin

Est une reproduction de : Validation de la version française d'une échelle d'évaluation des effets secondaires liés aux psychotropes (UKU-SERS-Pat) et description des effets secondaires présents dans une population de patients militaires bénéficiants d'un traitement antidépresseur Louise Klause 2024 1 vol. (123 f.)

Auteur(s) : Klause, Louise (1996-....)

Autre(s) auteur(s) : Saguin, Emeric (1989-....) psychiatre
Université Paris Cité 2019-....

Production : 2024

Note sur la description matérielle : L'impression du fichier génère 123 pages

Note sur les bibliographies et les index : Bibliogr. f. 95-104. Annexes

Note sur le contenu : En appendice, choix de documents

Note de thèses et écrits académiques : Reproduction de Thèse d'exercice Médecine Université Paris Cité 2024

Résumé ou extrait : État de l'art : La population militaire est, du fait de ses particularités d'emploi, particulièrement à risque de développer certaines pathologies psychiatriques (trouble de stress post-traumatique, trouble dépressif réactionnel et trouble de l'adaptation notamment) qui peuvent conduire à une prescription d'antidépresseur. Les effets secondaires des antidépresseurs ont un impact non négligeable sur l'observance des patients et, par voie de conséquence, sur le pronostic. Cependant, l'évaluation des effets secondaires est complexe ce qui fait qu'ils restent insuffisamment pris en compte

en pratique courante. Afin de préserver l'alliance thérapeutique et de garantir l'innocuité des traitements antidépresseurs, il est essentiel de développer des stratégies de dépistage de ceux-ci. Matériel et méthode : Notre travail de recherche s'est décomposé en deux temps, menés dans une population de patients militaires bénéficiant d'une primo-prescription d'antidépresseur. A partir d'un échantillon de 32 patients, nous avons préalablement validé en langue française l'échelle UKU-SER-Pat, conçue pour que les patients puissent rapporter les effets secondaires des traitements psychotropes, en la comparant avec l'UKU-SERS-Clin qui est une version du questionnaire passée par le clinicien. La deuxième partie du travail se consacrait à l'étude de la prévalence des effets secondaires dans une population de 53 patients ayant renseigné l'UKU- SERS-Pat entre 4 et 8 semaines après l'initiation d'un traitement antidépresseur. Résultats : Les résultats de notre recherche soutiennent la validité de l'échelle UKU-SERS-Pat en version française pour dépister les effets secondaires des traitements antidépresseurs. Les corrélations de Spearman ont montré une forte concordance entre l'échelle UKU-SERS-Pat et l'échelle UKU-SERS-Clin pour les effets secondaires psychiques ($r=0,671$, p