

# **Intérêt d'un suivi thérapeutique pharmacologique dans la prise en charge des patients traités par ustekinumab pour maladie de Crohn sévère**

Type de contenu : Texte

Type de médiation : sans médiation

Type de support : Volume

Titre(s) : Intérêt d'un suivi thérapeutique pharmacologique dans la prise en charge des patients traités par ustekinumab pour maladie de Crohn sévère / Julie Lavolé épouse Guyot,... ; sous la direction de Xavier Treton

Auteur(s) : Lavolé, Julie (1988-?.)

Autre(s) responsabilité(s) : Treton, Xavier (1974-....) (Directeur de thèse)

Université Paris-Sud 1970-2019 - Organisme de soutenance

Université de Paris-Sud, Faculté de médecine Le Kremlin-Bicêtre, Val-de-Marne - Organisme de soutenance

Editeur, producteur : 2018

Description matérielle : 1 vol. (43 f.) : ill. ; 30 cm

Note sur l'exemplaire : (BCSSA) Version électronique disponible au format pdf

Note sur les bibliographies et les index : Bibliographie : 25 réf.

Note de thèses et écrits académiques : Thèse d'exercice Médecine Paris-Sud 2018

Résumé ou extrait : INTRODUCTION : L'ustékinumab (UST) est un des médicaments de dernière ligne dans le traitement de la maladie de Crohn (MC) pour des patients réfractaires ou intolérants aux antiTNF. Actuellement, le dosage sérique des antiTNF est un outil de la prise en charge d'une MC en échappement à ce traitement. Il est donc légitime de s'interroger sur la pertinence d'un tel dosage pour l'UST. Le but de notre étude était d'évaluer l'association entre taux sérique d'UST et rémissions clinique, biologique et endoscopique durant la période d'entretien. MATERIEL ET METHODES : Nous avons réalisé une étude rétrospective monocentrique incluant des patients avec MC sévère ayant débuté un traitement par UST entre mars 2014 et janvier 2018. Le dosage d'UST était réalisé sur un sérum disponible prélevé dans le suivi habituel. Pour la rémission clinique, le critère de jugement était un score de Harvey-Bradschaw