

Asthme et aptitude militaire

Type de contenu : Texte

Type de médiation : sans médiation

Type de support : Volume

Titre(s) : Asthme et aptitude militaire : étude rétrospective des 182 candidats à l'engagement militaire asthmatiques ayant consulté à l'HIA Robert Picqué entre Octobre 2004 et Octobre 2005 / par Gabriel Gellie ; Sous la dir. du Médecin en chef Eric Renoux

Auteur(s) : Gellie, Gabriel (1978-....)

Autre(s) auteur(s) : Renoux, Éric (1954-....) pneumologue
Université Bordeaux-II 1971-2013

Production : 2006

Description matérielle : 1 vol. (152 f.) ; 30 cm

Titre traduit ajouté par le catalogueur : Asthma and military engagement retrospective study of 182 at the French military hospital Robert Picqué between October 2004 and October 2005 eng

Note sur les bibliographies et les index : Bibliogr. f. 122-128

Note de thèses et écrits académiques : Thèse d'exercice Médecine générale Bordeaux 2 2006

Résumé ou extrait : METHODE : Etude rétrospective incluant 202 candidats à l'engagement militaire asthmatiques, qui sont venus consulter un médecin pneumologue militaire en vue d'obtenir une aptitude entre les mois d'octobre 2004 et 2005 et qui ont répondu à un questionnaire auto-administré.
RESULTATS : Après avoir appliqué nos critères d'inclusion, 182 dossiers ont participé à notre étude. Parmi eux, 38 avaient un stade de leur asthme intermittent, 103 un stade persistant léger, 25 un stade persistant modéré et 13 un stade persistant sévère. Près de la moitié était déjà engagée depuis moins de 3 mois, et des événements récents avaient conduit à rediscuter leur aptitude, montrant ainsi les limites des critères d'aptitude actuels. Les facteurs de déclenchement des crises décrits par nos sujets sont : la poussière (56,7 %), le pollen (38,4 %), et l'exercice physique (34,1 %) ; tous ces facteurs sont susceptibles d'être rencontrés dans le milieu militaire. Ceci est confirmé par le résultat des prick test : plus de 3 allergènes sont retrouvés chez 49 % des sujets. Malgré l'association contre-indiquée avec l'asthme, 41,34 % des sujets sont des fumeurs actifs. Avec des difficultés décrites pour prendre leur décision, entre 7,5 % et 12,7 % ont été déclarés inaptes définitifs par les pneumologues à l'issue de leur consultation.
DISCUSSION : Malgré les limites dues au mode de recueil des données, nos candidats diffèrent peu de la population des asthmatiques du même âge : près de la moitié d'entre eux sont des fumeurs, ils connaissent mal leur statut vis-à-vis des allergies, et leur traitement n'est pas en conformité avec les consensus

internationaux. En revanche, ils décrivent dans l'ensemble un meilleur contrôle de leur maladie et une meilleure qualité de vie. Concernant l'engagement militaire, l'étude comparative avec les différentes armées étrangères montre une moindre sévérité de la France, qui devrait être corrigée lors d'une prochaine révision nécessaire des critères d'aptitude.

Sujet - Collectivité : France Armée. -- Services de santé

Sujet - Nom commun : Soldats -- Maladies

Asthmatiques -- Examens médicaux

Médecine militaire -- France

Forces armées -- Recrutement et engagement

Forme, genre ou caractéristiques physiques : Thèses et écrits académiques