

Dépistages des hépatites B et C à l'incorporation de la Légion Étrangère

Type de contenu : Texte

Type de médiation : sans médiation

Type de support : Volume

Titre(s) : Dépistages des hépatites B et C à l'incorporation de la Légion Étrangère / Max-Émilien Bancel ; directeur de thèse David Varvenne

Est reproduit comme : Dépistages des hépatites B et C à l'incorporation de la Légion Étrangère Max-Émilien Bancel 2020

Auteur(s) : Bancel, Max-Émilien (1993-....)

Autre(s) auteur(s) : Varvenne, David (1985-....)
Université Paris Descartes Faculté de médecine

Production : 2020

Description matérielle : 1 vol. (56 p.) : ill., cartes ; 30 cm

Titre traduit ajouté par le catalogueur : Hepatitis B and C screening at the incorporation of the French Foreign Legion.

Note sur les bibliographies et les index : Bibliogr. p. 50-54 (77 réf.). Annexes

Note de thèses et écrits académiques : Thèse d'exercice Médecine Université Paris Descartes 2020

Résumé ou extrait : La Légion Étrangère recrute des volontaires quelle que soit leur nationalité. Ce sont des migrants par définition. Le dépistage des hépatites B et C est recommandé dans cette population, et proposé à l'incorporation. L'objectif de ce travail est de décrire les patients positifs pour ce dépistage entre 2014 et 2016, et d'évaluer son intérêt. Matériels et méthodes : Il s'agit d'une étude descriptive rétrospective mono centrique. Le dossier de consultation spécialisée de chaque patient positif pour l'hépatite B et/ou C a été analysé. Les variables recueillies sont sociodémographiques (âge, sexe, pays d'origine, présence de tatouage, notion d'incarcération, revenu et profession antérieurs) et médicales (antécédents, interrogatoire, bilan biologique hépatique et viral, score de fibrose et résultats échographiques). Résultats : Sur les 4611 patients incorporés, 45 cas ont été diagnostiqués, soit 19 cas pour l'hépatite C et 27 cas pour l'hépatite B. Un seul avait une co-infection VHB et VHC. La prévalence de l'AgHBs + était de 0,58%, celle de l'Ac VHC de 0,41%. La majorité (97,8%) n'avait pas d'atteinte organique. La majorité venait de pays à forte prévalence. La prévalence par pays est inférieure à celle du pays d'origine. Le pourcentage de suivi complet est de 56%. Conclusion : La prévalence des hépatites B et C observée est plus faible qu'attendue. Ceci est explicable par une population sélectionnée

médicalement, difficilement comparable à la population migrante en France. Le dépistage systématique proposé est nécessaire et de bonne qualité. Cependant le suivi souffre de nombreux perdus de vue, il doit être amélioré.

Sujet - Collectivité : France Armée. Légion étrangère. -- Recrutement et engagement

Sujet - Nom commun : Hépatite B -- Dépistage

Hépatite C -- Dépistage

Forme, genre ou caractéristiques physiques : Thèses et écrits académiques