

Observations d'anatomie pathologique, accompagnées de l'histoire des maladies qui s'y rapportent et dont les pièces sont conservées au musée de la Faculté de médecine de Strasbourg.

Type de contenu : Texte

Type de médiation : sans médiation

Titre(s) : Observations d'anatomie pathologique, accompagnées de l'histoire des maladies qui s'y rapportent et dont les pièces sont conservées au musée de la Faculté de médecine de Strasbourg. / Nouveau recueil publié sous les auspices de la Faculté par C.-H. Ehrmann,...

Contient : Description d'une luxation congénitale des deux fémurs par relâchement de l'appareil ligamenteux...

Ostéophyte gélatineux de l'omoplate et de l'humérus. Désarticulation du bras et extirpation du scapulum en totalité

Bassin avec écartement des os pubis séparés dans leur symphyse d'un homme de 49 ans atteint d'extrophie de vessie

Tumeurs fibreuses de la dure-mère

Tumeurs développées dans les nerfs. Névromes. Névrome du nerf sciatique. Névrome du nerf médian

Tumeurs multiples fibro-calcaires développées dans le cerveau, la moelle épinière et ses enveloppes

Auteur(s) : Ehrmann, Charles Henri (1792-1878)

Autre(s) responsabilité(s) : Larrey, Hippolyte (1808-1895) (Ancien possesseur) (Donateur)

Larrey, Hippolyte (1808-1895) (Ancien possesseur) (Donateur)

Rouis, Jean-Louis (1822-1908) (Ancien possesseur)

Editeur, producteur : Strasbourg : Veuve Berger-Levrault, 1863

Description matérielle : 1 vol. (pagination multiple) : pl. en noir et en coul. ; 47 cm

Note sur la provenance : (BCSSA) Ex-libris du baron Larrey (cachet) ; Ex-dono manuscrit du baron Larrey : "au Val-de-Grâce" [Af 6]

(BCSSA) Ex-libris du baron Larrey (cachet) ; Mention manuscrite du baron Larrey : "Donné par le professeur Ehrmann. H. Larrey" [Af 6 bis]

(EMSLB de Bron) Ex-dono : offert à l'ESSM de Lyon par le médecin principal de 1^e classe Rouis, ancien sous-directeur de l'Ecole du Service de santé de Strasbourg

Note sur le contenu : 6 parties en 1 vol. I. Description d'une luxation congénitale des deux fémurs par relâchement de l'appareil ligamenteux, suivie de quelques réflexions sur les causes et le traitement de cette maladie, par Ehrmann ; II. Ostéophyte gélatineux de l'omoplate et de l'humérus. Désarticulation du bras et extirpation du scapulum en totalité. Observation communiquée par M. le professeur Rigaud ; III. Bassin avec écartement des os pubis séparés dans leur symphyse d'un homme de 49 ans atteint

d'extrophie de vessie, par Ehrmann ; IV. Tumeurs fibreuses de la dure-mère. Première observation, recueillie par le professeur Stoeber : tumeur fibro-fongueuse de la dure-mère crânienne, avec ramollissement du cerveau. Deuxième observation : tumeur fibreuse de la dure-mère crânienne ; V. Tumeurs développées dans les nerfs. Névromes. Névrome du nerf sciatique, observé par M. le Dr Frédéric Lauth. Névrome du nerf médian, observé par M. le Dr Aronssohn ; VI. Tumeurs multiples fibro-calcaires développées dans le cerveau, la moelle épinière et ses enveloppes. Observation recueillie par M. le Dr Strohl, et suivie de recherches histologiques, par M. le Dr Wieger