

Sur quels déterminants est-il possible d'agir afin de diminuer le recours aux urgences hospitalières adultes pour des patients relevant de la consultation non programmée en soins primaires?

Type de contenu : Texte

Type de médiation : sans médiation

Type de support : Volume

Titre(s) : Sur quels déterminants est-il possible d'agir afin de diminuer le recours aux urgences hospitalières adultes pour des patients relevant de la consultation non programmée en soins primaires? : revue de la littérature / Louis Lamarque ; sous la direction de Cécile Ficko

Auteur(s) : Lamarque, Louis

Autre(s) auteur(s) : Ficko Bertho, Cécile (1977-....) médecin
Université Sorbonne Paris Nord Bobigny, Villetaneuse, Seine-Saint-Denis 1970-....

Production : 2021

Description matérielle : 1 vol. (116 f.) : ill. ; 30 cm

Note sur les bibliographies et les index : Bibliogr. f. 98-103

Note de thèses et écrits académiques : Thèse d'exercice Médecine Université Paris 13 2021

Résumé ou extrait : Selon les études, on considère qu'en moyenne 20 à 25% des consultants des services d'urgences pourraient être pris en charge de manière optimale en médecine de soin primaire. la question est dès lors de savoir pourquoi ces derniers consultent réellement aux urgences?

Sujet - Nom commun : Urgences médicales
Premiers soins
Hôpitaux -- Services des urgences

Forme, genre ou caractéristiques physiques : Thèses et écrits académiques