

Prévalence de la pancréatite chronique, de la comitialité et de la cirrhose en unité d'alcoologie

Titre(s) : Prévalence de la pancréatite chronique, de la comitialité et de la cirrhose en unité d'alcoologie
[Texte imprimé] : caractéristiques socio-démographiques de la population étudiée : étude transversale descriptive sur 16 années consécutives (4513 sujets inclus) / Juliette Frossard-Giboulet ; [sous la dir. du] Docteur Latrive

Auteur(s) : Frossard-Giboulet, Juliette

Autre(s) responsabilité(s) : Latrive, Jean-Paul (Directeur de thèse)
Université de Picardie Jules Verne - Organisme de soutenance

Editeur, producteur : [S.l.] : [s.n.], 2004

Description matérielle : 1 vol. (130 f.) : graph. ; 30 cm

Titre traduit ajouté par le catalogueur : Prevalence of chronic pancreatitis, epileptic seizures and cirrhosis in alcoology department : socio-demographic characteristics of the studied population : transversal and descriptive study over 16 consecutive years (based upon 4 513 patients)

Note sur disponibilité : Autorisation de publication délivrée par le jury

Note sur la provenance : Don de l'Association des amis du Musée du service de santé des armées au Val-de-Grâce (BCSSA)

Note sur les bibliographies et les index : Bibliogr. f. 119-130

Note de thèses et écrits académiques : Thèse d'exercice Médecine 2004 Amiens

Résumé ou extrait : L'existence au Centre Hospitalier de Compiègne d'une unité d'alcoologie permet un recueil systématique de données épidémiologiques chez les patients hospitalisés au sein de cette structure. En utilisant ce recueil comme base de données, nous avons réalisé une enquête transversale descriptive sur 16 années consécutives afin d'évaluer la prévalence de la pancréatite chronique, de la comitialité et de la cirrhose alcooliques dans cette population homogène de patients alcoolo-dépendants. 4 513 patients ont été inclus. Les prévalences de la pancréatite chronique alcoolique et de la comitialité alcoolique étaient respectivement de 1,8 % et 7,1 %. Pour ces deux pathologies, il n'a pas été noté de variation significative de la prévalence au cours du temps. La prévalence de la cirrhose alcoolique était de 5,6 % pour l'ensemble du recueil. Elle a augmenté de façon significative (p

Sujet - Nom commun : Alcool -- Toxicologie -- Thèses et écrits académiques