

Prise en charge spécialisée de manifestations rhumatismales chroniques post-chikungunya

Titre(s) : Prise en charge spécialisée de manifestations rhumatismales chroniques post-chikungunya
[Texte imprimé] : étude rétrospective de 159 cas, Saint-Denis de la Réunion, 2006-2012 / Emilie Javelle ; sous la direction de Fabrice Simon

Auteur(s) : Javelle, Emilie (1985-....)

Autre(s) responsabilité(s) : Simon, Fabrice (1963-....) (Directeur de thèse)
Aix-Marseille Université - Organisme de soutenance
Aix-Marseille Université, Faculté de médecine 2012- - Organisme de soutenance

Editeur, producteur : [S.l.] : [s.n.], 2014

Description matérielle : 1 disque optique numérique (CDROM) : ill. en coul. ; 12 cm

Titre traduit ajouté par le catalogueur : Specific management of post chikungunya rheumatic disorders a retrospective study of 159 cases in Reunion Island, 2006-2012 eng

Note sur l'édition et l'histoire bibliographique : Contient un article en anglais, coécrit par l'auteure, intitulée : "Specific management of post chikungunya rheumatic disorders : a retrospective study of 159 cases in Reunion Island, 2006-2012"

Note sur l'exemplaire : Version électronique disponible au format pdf (BCSSA)

Note sur les bibliographies et les index : Bibliographie : 68 réf.

Note sur le contenu : Contient 3 fichiers PDF : Dos de thèse (98 Ko), Page de garde (103 Ko), Thèse Emilie Javelle 22 mai 2014 (3,4 Mo)

Note de thèses et écrits académiques : Thèse d'exercice Médecine. DES de médecine interne 2014 Aix-Marseille Reproduction de

Résumé ou extrait : Le chikungunya (CHIK) est un alphavirus devenu pandémique responsable de troubles ostéo-articulaires parfois durables avec un lourd retentissement médico-économique. Le spectre clinique de la phase post-CHIK (pCHIK) est riche et des recommandations de bonnes pratiques sont indispensables. PATIENTS et METHODE? : Nous avons recueilli rétrospectivement sur 6 ans les données cliniques et thérapeutiques de patient référés à l'équipe rhumatologique de Saint Denis, La Réunion pour des douleurs persistantes après une infection CHIK confirmée. Les rhumatismes inflammatoires chroniques (RIC) de novo étaient catégorisés selon des critères validés et l'efficacité du méthotrexate (MTX) a été évaluée. RESULTATS? : 159 dossiers médicaux ont été étudiés. Les troubles musculo-squelettiques (TMS) étaient adressés précocement au spécialiste et comportaient surtout des pathologies mécaniques de l'épaule, des syndromes canaux et de polyarthralgies distales bilatérales parfois

oedémateuse répondant bien à une corticothérapie courte. 94 patients présentaient un RIC de novo pCHIK?: 40 cas de polyarthrite rhumatoïde, 33 de spondylarthrite et 21 de polyarthrite indifférenciée?; la moitié présentait des destructions osseuses. 72 RIC ont été traités par MTX avec 75?% d'efficacité significativement associée à un début précoce et une intégrité osseuse à l'introduction. CONCLUSION?: Cette étude détaille le spectre des TMS pCHIK et souligne l'intérêt d'identifier pour traiter précocement par MTX les RIC novo.?Nous proposons un algorithme diagnostique et thérapeutique pour aider les cliniciens dans la prise en charge des douleurs p CHIK, l'enjeu étant de limiter l'impact fonctionnel et économique

Type de ressource électronique : Type de fichier : PDF

Sujet - Collectivité :

Sujet - Nom commun : Effets secondaires -- Effets secondaires -- Thèses et écrits académiques
Chikungunya -- Diagnostic -- Thèses et écrits académiques
Rhumatisme -- Thèses et écrits académiques
Médecine militaire -- Thèses et écrits académiques -- France -- Réunion