

Les lymphomes retro-peritoneaux associés à l'infection par le VIH

Titre(s): Les lymphomes retro-peritoneaux associés à l'infection par le VIH [Texte imprimé] : à propos de 2 observations et revue de la littérature / par Yann-Laurent Violin ; Sous la dir. du médecin en chef Flavien Durand-Dastes

Auteur(s): Violin, Yann-Laurent (1977-....)

Autre(s) responsabilité(s): Durand-Dastes, Flavien (1960-....) (Directeur de thèse)
Université Bordeaux-II (1971-2013) - Organisme de soutenance

Editeur, producteur: [S. l.] : [s.n.], 2006

Description matérielle: 1 vol. (101 f.) ; 30 cm

Titre traduit ajouté par le catalogueur: Retroperitoneal lymphoma and HIV infectious two cases reports and review of literature eng

Note sur disponibilité: Publication autorisée par le jury

Note sur les bibliographies et les index: Bibliogr. f. 95-100

Note de thèses et écrits académiques: Thèse d'exercice Médecine générale 2006 Bordeaux 2

Résumé ou extrait: Le lymphome est une pathologie tumorale bien connue. Son association au VIH et sa localisation rétro-péritonéale en font une pathologie souvent silencieuse, agressive et de diagnostic tardif. La présence de nombreuses structures vitales dans cette région est responsable de la pluralité des manifestations cliniques souvent sous-estimées. Le traitement du lymphome est maintenant bien établi et ne diffère pas d'un patient VIH à un patient sain. Cependant, la réponse du patient aux chimiothérapies et son espérance de vie sont dépendantes de la rapidité de la prise en charge. Afin de mieux appréhender cette pathologie et de la diagnostiquer au plus tôt, une connaissance des mécanismes physiopathologiques de son apparition est nécessaire. Son diagnostic repose essentiellement sur une localisation par scanner et une étude anatomo-pathologique de la masse. L'utilisation du PETscan peut être discutée pour un bilan d'extension ou un bilan évolutif. Le traitement du lymphome chez le patient VIH présente quelques particularités. Hormis le risque d'infection plus important et la nécessité d'une bonne maîtrise du VIH, certaines molécules n'ont pas prouvé leur efficacité dans cette situation. Enfin, la prise en charge multidisciplinaire est indispensable pour donner toutes les chances au patient.

Sujet - Nom commun: Lymphomes -- Thèses et écrits académiques

Espace rétropéritonéal -- Tumeurs -- Thèses et écrits académiques

Scanographie -- Thèses et écrits académiques

Polychimiothérapie -- Thèses et écrits académiques

Infections à VIH -- Patients -- Thèses et écrits académiques