

Bilan de santé périodique chez des officiers supérieurs

Type de contenu : Texte

Type de médiation : sans médiation

Type de support : Volume

Titre(s) : Bilan de santé périodique chez des officiers supérieurs : évaluation des pratiques médicales / Estelle Jammot,... ; sous la direction du professeur Thierry Carmoi

Est une reproduction de : Bilan de santé périodique chez des officiers supérieurs : évaluation des pratiques médicales Estelle Jammot 2018

Auteur(s) : Jammot, Estelle (1991-....)

Autre(s) auteur(s) : Carmoi, Thierry (1965-....)

Aix-Marseille Université 2012-....

Aix-Marseille Université Faculté de médecine 2012-2018

Production : 2018

Description matérielle : 1 vol. (97 f.) : ill. ; 30 cm

Note sur l'exemplaire : (BCSSA) Version électronique disponible au format pdf

Note sur les bibliographies et les index : Bibliogr. f. 83-87

Note de thèses et écrits académiques : Reproduction de Thèse d'exercice Médecine Aix-Marseille 2018
Reproduction de Mémoire de DES Médecine générale Aix-Marseille 2018

Résumé ou extrait : Introduction : L'examen périodique de santé systématique suscite toujours le débat quant à son bénéfice. Les officiers-supérieurs d'Ile-de-France en bénéficient au cours de leur visite médicale périodique (VMP) à l'Hôpital d'Instruction des Armées du Val-de-Grâce. L'objectif était de déterminer si leur état de santé justifiait d'une surveillance différant des recommandations nationales. Matériel et méthodes : Une étude rétrospective, monocentrique et descriptive a été réalisée. Pour être inclus, le patient devait avoir réalisé une ou plusieurs VMP associées à un bilan complémentaire (audiogramme, ophtalmologique, biologique, ...) entre janvier 2007 et décembre 2015, à l'exclusion des préfets. Résultats : 378 dossiers-patients ont été inclus pour un total de 1276 dossiers cliniques et 1215 dossiers biologiques étudiés. L'âge moyen était de 53,0 ans ($\pm$ 5,6 ans). La prévalence des IDM dans notre étude était similaire à celle de la population générale (17/1276 versus 780000/66millions (M), $p = 0.61$). Il existait une différence significative de la prévalence de l'HTA dans notre population par rapport à la population de la même tranche d'âge (8,7% -112/1276- versus 23,5% -4M/17M-, p

Sujet - Collectivité : Hôpital d'instruction des armées du Val-de-Grâce Paris. 1793-2016.

Sujet - Nom commun : Bilans de santé

Dépistage

Médecine militaire

Forme, genre ou caractéristiques physiques : Thèses et écrits académiques