

Facteurs épidémiologiques de la naupathie

Type de contenu : Texte

Type de médiation : sans médiation

Type de support : Volume

Titre(s) : Facteurs épidémiologiques de la naupathie : étude cas-témoins dans la Marine nationale à Brest / Daphné Martinez,... ; sous la direction de Lois Bonne et de Bernard Le Floch

Est reproduit comme : Facteurs épidémiologiques de la naupathie étude cas-témoins dans la Marine Nationale à Brest Daphné Martinez 2018 Brest Université de Bretagne Occidentale

Auteur(s) : Martinez, Daphné (1990-....)

Autre(s) auteur(s) : Bonne, Louis (1956-....)
Le Floch, Bernard (1956-....) Professeur agrégé de médecine
Université de Bretagne Occidentale 1971-2025

Production : 2018

Description matérielle : 1 vol. (57 f.) ; 30 cm

Note sur l'exemplaire : (BCSSA) Version électronique disponible au format pdf

Note sur les bibliographies et les index : Bibliogr. f. 53-56 (51 réf.)

Note de thèses et écrits académiques : Thèse d'exercice Médecine Brest 2018

Résumé ou extrait : Introduction : La naupathie, la plus fréquente des cinétoses, est connue depuis l'antiquité. Pourtant, ces facteurs favorisants sont toujours discutés et il n'existe que très peu d'étude épidémiologique sur cette cinétose. Notre étude cas-témoin a permis de comparer des marins aux ressentis différents du mal de mer pour contrôler la véracité d'un certain nombre de caractéristiques épidémiologiques en recherchant une différence significative entre les deux groupes. Méthode : Nous avons réalisé 177 entretiens individuels et composés un groupe cas de 69 patients malades et un groupe témoins de 108 marins amarinés. Le groupe cas était composé de marins malades en mer et en demande de rééducation. Le groupe témoin était constitué de marins qui ne souffraient pas du mal de mer. Ils exerçaient tous sur des bateaux de la Marine Nationale de Brest. À partir d'un questionnaire, nous avons cherché une relation entre la naupathie et un certain nombre de critères épidémiologiques connus : prévalence féminine, capacité d'adaptation, rôle des entrées neurosensorielles, phobies, migraine, vagotonie, mal du débarquement. Résultats : Les résultats ont permis de confirmer certaines de ces corrélations, mais d'autres relations nous sont apparues moins évidentes comme : la vagotonie, le cycle menstruel et le terrain migraineux. Enfin nous avons pu indiquer le vecteur gravito-inertiel et l'émotivité

comme deux caractéristiques importantes dans la genèse de la naupathie. Discussion : Notre étude ne nous a pas permis de créer des critères suffisant pour une sélection à l'engagement. Par contre, elle a permis de mieux définir les axes à prendre en compte lors de la rééducation des patients, tel que l'importance des mouvements de piston et la participation cognitive qui semblent indissociables de toutes prises en charge thérapeutique de la naupathie

Sujet - Collectivité : France Marine.

Sujet - Nom commun : Affectivité

Études cas-témoins

Mal des transports -- Épidémiologie

Marins -- France -- Brest (Finistère) -- Soins médicaux

Médecine navale

Phobies

Forme, genre ou caractéristiques physiques : Thèses et écrits académiques