

Impact de l'infection par le virus Zika sur l'état clinique et la qualité de vie des patients à moyen terme

Type de contenu : Texte

Type de médiation : b

Type de support : Ressource dématérialisée

Titre(s) : Impact de l'infection par le virus Zika sur l'état clinique et la qualité de vie des patients à moyen terme : Étude descriptive sur un an au sein de la communauté de défense de Guyane (ZIFAG) / Hubert Henrys d'Aubigny ; sous la direction de Fabrice Simon

Est reproduit comme : Impact de l'infection par le virus Zika sur l'état clinique et la qualité de vie des patients à moyen terme étude descriptive sur un an au sein de la communauté de défense de Guyane (ZIFAG) par Hubert Henrys d'Aubigny d'Esmyards,... 2017 1 vol. (56 p.)

Auteur(s) : Henrys d'Aubigny d'Esmyards, Hubert (1991-....)

Autre(s) auteur(s) : Simon, Fabrice (1963-2022)

Aix-Marseille Université 2012-....

Aix-Marseille Université Faculté de médecine 2012-2018

Production : 2017

Titre traduit ajouté par le catalogueur : Impact of Zika virus infection on the patient's clinical status and quality of life, in the medium term Descriptive study on the French Guyana defense community (ZIFAG) eng

Note sur le titre et les responsabilités : Titre provenant de l'écran-titre

Note de thèses et écrits académiques : Thèse d'exercice Médecine. Médecine générale Aix-Marseille 2017
Mémoire de DES Médecine. Médecine générale Aix-Marseille 2017

Résumé ou extrait : Introduction : le virus Zika (ZIKV) est une des émergences du XXI^è siècle. Transmis par piqûre de moustique mis aussi par voie sexuelle, il était, jusqu'en 2007, seulement connu pour causer un syndrome dengue-like bénin. Son expansion a révélé l'existence de complications à type de syndrome de Guillain-Barré et de malformations fœtales. Les conséquences à moyen terme d'une infection bénigne à ZIKV sont ignorées. La discrimination clinique entre les virus de la dengue, du chikungunya et du Zika, souvent en situation de co-endémie, est difficile et nécessite une connaissance précise des symptômes. Cette thèse, qui s'inscrit dans le projet de recherche ZIFAG, a pour but d'établir une description clinique de l'infection à ZIKV, et de déterminer si elle comporte une phase chronique et si elle cause à moyen terme une altération de la qualité de vie. Matériel et méthode : ZIFAG est une étude descriptive longitudinale des cas incidents d'infection au virus Zika au sein de la communauté de défense en Guyane.

Les patients ont été suivis pendant trois mois à un an. L'inclusion (du 01/03/16 au 01/03/17) concernait les patients majeurs présentant un exanthème, hormis les femmes enceintes. L'infection à ZIKV devait être confirmée par RT-PCR. Les données cliniques étaient recueillies d'après un examen standardisé, et par une auto-description quotidienne des symptômes pendant le premier mois. La qualité de vie était évaluée par auto-questionnaire (échelles analogiques, RAPID 3 et SF12). Résultats : quarante-neuf patients ont été inclus. Les principaux symptômes, avec leurs durées et intervalles de confiance (IC) à 95%, étaient : l'exanthème (100%), 12 jours (IC 10-15) ; l'asthénie (84%, IC 74-95), 19 jours (IC 16-23) ; les céphalées (80%, IC 68-92), 9 jours (IC 6-12) ; le prurit (73%, IC 66-86), 6 jours (IC 4-8) ; la conjonctivite (64%, IC 50-78), 9 jours (IC 6-12), la fièvre (62%, IC 48-76), 3 jours (IC 2-4) ; les arthralgies (60%, IC 46-74), 9 jours (IC 5-12). Seize patients (33%, IC 18-47) étaient concernés par des aréflexies réversibles. Seul un patient (2%) a présenté des symptômes chroniques (arthralgies). Du score SF-12, seule la composante physique était altérée, faiblement. Tous les paramètres de qualité de vie revenaient à un niveau stable dès le deuxième mois au plus tard, et l'impact fonctionnel était faible. Aucune complication n'a été retrouvée. Conclusion : dans sa forme habituelle, l'infection par le ZIKV n'a qu'un impact très limité sur la santé des patients. Le syndrome dengue-like durent deux à trois semaines. Les hypo- ou aréflexies sont fréquentes, et témoignent du neurotropisme du virus. Seules les arthralgies semblent pouvoir se prolonger dans de rares cas, ainsi que l'asthénie durant quelques semaines. Il n'existe pas d'altération de la qualité de vie à moyen terme. Une étude comparative et à plus grande échelle serait nécessaire pour préciser la prévalence des signes neurologiques (paresthésies, aréflexies, diminution de la force) et leurs valeurs prédictives de complications.

Configuration requise : un logiciel capable de lire un fichier au format : PDF

Sujet - Nom commun : Médecine générale

Sujet - Nom géographique : Guyane

Forme, genre ou caractéristiques physiques : Thèses et écrits académiques

Adresse électronique et mode d'accès : <https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01908283>

https://www.gedissa.org/main/document/document.php?cidReq=BCSSA&id_session=0&gidReq=0&grad ebook=0&origin=&action=download&id=429