

Étude de la prévalence de l'état de stress post-traumatique chez les marins-pompiers du Bataillon de Marins-Pompiers de Marseille

Type de contenu : Texte

Type de médiation : sans médiation

Type de support : Volume

Titre(s) : Étude de la prévalence de l'état de stress post-traumatique chez les marins-pompiers du Bataillon de Marins-Pompiers de Marseille / Charlène Fraysse ; sous la direction de Frédérique Gignoux-Froment

Est une reproduction de : Étude de la prévalence de l'état de stress post-traumatique chez les marins-pompiers du Bataillon de Marins-Pompiers de Marseille Charlène Fraysse 2019

Auteur(s) : Fraysse, Charlène (1991-....)

Autre(s) auteur(s) : Gignoux-Froment, Frédérique (1981-....)

Aix-Marseille Université 2012-.... 2012-....

Aix-Marseille Université Faculté des sciences médicales et paramédicales 2018-....

Editeur, producteur : 2019

Description matérielle : 1 vol. (80 f.) ; 30 cm

Titre traduit ajouté par le catalogueur : Estimation of the prevalence of post-traumatic stress disorder in marine firefighters of the military fire brigade of Marseille eng

Note sur les bibliographies et les index : Bibliogr. f. 56-63 (118 réf.)

Note sur le contenu : En appendice, choix de documents, annexes

Note de thèses et écrits académiques : Reproduction de Thèse d'exercice Médecine. Médecine générale Aix-Marseille 2019

Reproduction de Mémoire de DES Médecine. Médecine générale Aix-Marseille 2019

Résumé ou extrait : Objectif : en France, une seule étude, réalisée en 2007, a exploré la prévalence de l'ESPT dans la population des marins-pompiers du BPM. Elle retrouve un taux de 1.16%, identique à celui de la population générale. Or, les marins-pompiers sont sur exposés aux interventions potentiellement traumatogènes. L'objectif de notre étude est d'estimer la prévalence de l'ESPT chez les marins pompiers du BPM au sein d'un effectif plus large que la précédente. Matériel et Méthodes : durant six mois, les marins-pompiers se présentant à leur VMP au SMU de Plombières ont rempli un auto-questionnaire comprenant la PCLS. Le seuil diagnostique d'un ESPT est un score PCLS $\geq$ 44. Résultats :

parmi les 356 marins-pompiers inclus, 4.49% ont un ESPT avec un intervalle de confiance de [2.34 ;6.65] à 95%. Les déterminants associés sont une fatigue durable, des répercussions négatives sur la vie familiale, professionnelle, sociale, et le ressenti d'un manque de soutien institutionnel. Les événements traumatisants les plus cités sont les interventions avec les enfants, les accidents de la voie publique et les arrêts cardio-respiratoires. Conclusion : nous retrouvons une prévalence plus élevée que l'étude réalisée en 2007. Ces résultats se rapprochent des données internationales et confirment que les sauveteurs constituent une population à risque. Afin de comparer avec les études internationales, de nouvelles recherches avec la PCL-5 seraient souhaitables. Enfin, un travail qualitatif permettrait d'étudier plus spécifiquement les facteurs associés à la survenue d'un ESPT.

Aims. In France, only one research, achieved in 2007, have been carried out on the prevalence of firefighters' PTSD at the fire brigade in Marseille (BMPM). It find a rate of 1.16%, like the general population. However, firefighters are at risk of PTSD because of potentially traumatic interventions. We aim at estimate the prevalence of PTSD in firefighters of the BMPM. Procedure. During six months, firefighters doing their medical periodic check-up at the Medical Service of the Unity of Plombières, have filled a self-questionnaire with PCLS. The diagnosis threshold of PTSD is a score PCLS $\geq$ 44. Results. Among 356 firefighters counting, 4.49% have a PTSD with a confidence interval of [2.34 ;6.65] at 95%. Factors associated are sustainable tiredness, negative repercussions on family, professional, social life and a feeling of a lack of institutional support. Traumatic events which are the most quoted are interventions with children, road accidents and cardiorespiratory arrest. Conclusion. The prevalence is most important than the study of 2007. These results approximate international data and corroborate that rescuers are at risk. To compare with international studies, new survey with PCL-5 would be recommended. Finally, a qualitative research could defined more precisely factors associated with the occurrence of PTSD.

Sujet - Collectivité : France Marine. Bataillon de marins-pompiers de Marseille.

Sujet - Nom commun : État de stress post-traumatique

Forme, genre ou caractéristiques physiques : Thèses et écrits académiques