

Résultats à deux ans de recul des patients traités par méthode AMIC pour une lésion ostéocondrale du genou

Type de contenu : Texte

Type de médiation : b

Type de support : Ressource dématérialisée

Titre(s) : Résultats à deux ans de recul des patients traités par méthode AMIC pour une lésion ostéocondrale du genou / Matthieu Peras ; sous la direction de Olivier Barbier

Est reproduit comme : Résultats à deux ans de recul des patients traités par méthode AMIC pour une lésion ostéocondrale du genou Matthieu Peras 2022 1 vol. ([42]-29 f.)

Auteur(s) : Peras, Matthieu (1994-....)

Autre(s) auteur(s) : Barbier, Olivier (1981-....)

Aix-Marseille Université 2012-....

Aix-Marseille Université Faculté des sciences médicales et paramédicales 2018-....

Production : 2022

Note(s) : Présentée sous la forme d'une thèse-article

Note sur le titre et les responsabilités : Titre provenant de l'écran-titre

Note de thèses et écrits académiques : Thèse d'exercice Médecine. Chirurgie orthopédique et traumatologique Aix-Marseille 2022

Mémoire de DES Médecine. Chirurgie orthopédique et traumatologique Aix-Marseille 2022

Résumé ou extrait : Introduction : les défauts ostéocondraux de la surface articulaire du genou d'origine traumatique ou secondaire à une ostéocondrite sont pourvoyeurs de gonarthrose à moyen terme. Lorsque les défauts cartilagineux sont de taille supérieure à 2cm² et inférieure à 8cm² la méthode AMIC (Autologous Matrix-Induced Chondrogenesis) peut-être proposée. Cette technique consiste à réaliser des microfractures au sein de la perte de substance, et de l'occlure avec une matrice de collagène de type I et III (ChondroGide®) afin d'induire un cartilage de novo au sein de la lésion. L'objectif principal de cette étude est d'analyser à 2 ans de recul les résultats fonctionnels et radiologiques de cette technique. Notre hypothèse est que cette technique est efficace cliniquement et radiologiquement avec un recul minimum de deux ans après la chirurgie. Matériels et méthodes : il s'agit d'une étude rétrospective multicentrique (16 centres) et multi opérateurs (18 chirurgiens séniors). Tous les patients opérés entre septembre 2011 et janvier 2020 selon la technique AMIC avec une membrane ChondroGide® étaient inclus. Une évaluation par un questionnaire des scores SF36, KOOS, et IKDC était réalisée en pré opératoire et au cours du suivi. Une IRM à 2 ans était également réalisée et analysée afin d'évaluer le comblement de la perte de

substance via l'échelle MOCART. Résultats : 102 patients (68 hommes et 34 femmes) âgés de 15 à 51 ans, ont été inclus. Le recul moyen était de 2,5 ans. La perte de substance moyenne était de 3,44 cm². Les résultats montraient une amélioration significative sur les scores fonctionnels SF-36, KOOS, et IKDC. Le score MOCART moyen était de 75% à deux ans post-opératoire. Conclusion : la méthode AMIC® avec la membrane ChondroGide® est significativement efficace à deux ans post-opératoire pour le traitement d'une lésion ostéocondrale du genou.

Configuration requise : un logiciel capable de lire un fichier au format : PDF

Sujet - Nom commun : Genou -- Chirurgie

Cartilage

Sportifs -- Lésions et blessures

Forme, genre ou caractéristiques physiques : Thèses et écrits académiques

Adresse électronique et mode d'accès : <https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03798456>

https://www.gedissa.org/main/document/showinframes.php?cidReq=BCSSA&id_session=0&gidReq=0&gradebook=0&origin=&id=153131