

Notice pdf - Prévalence du surpoids et de l'obésité au sein d'_____

Type de contenu : Texte

Type de médiation : sans médiation

Type de support : Volume

Titre(s) : Prévalence du surpoids et de l'obésité au sein des forces armées françaises en 2017 / Livia Mannaioni,... ; sous la direction d'Anne Montois et Rémy Michel

Est une reproduction de : Prévalence du surpoids et de l'obésité au sein des forces armées françaises en 2017 Livia Mannaioni 2019

Auteur(s) : Mannaioni, Livia (1992-....)

Autre(s) responsabilité(s) : Montois, Anne (1980-....) (Directeur de thèse)

Michel, Rémy (1967-....) (Directeur de thèse)

Université Claude Bernard Lyon - Organisme de soutenance

Editeur, producteur : 2019

Description matérielle : 1 vol. (89 f.) : ill. ; 30 cm

Note sur l'exemplaire : (BCSSA) Version électronique disponible au format pdf

Note sur les bibliographies et les index : Bibliogr. f. 79-84 (69 réf.)

Note de thèses et écrits académiques : Reproduction de Thèse d'exercice Médecine Lyon 1 2019

Résumé ou extrait : Introduction : La prévalence du surpoids et de l'obésité augmente chaque année dans le monde. L'obésité est considérée comme une maladie chronique à part entière et le terme "épidémie de l'obésité" est actuellement employé pour évoquer ce phénomène. La France n'est pas épargnée par ce problème de santé publique. Quelques études se sont intéressées à la problématique de la surcharge pondérale au sein des Forces armées françaises mais uniquement dans certaines armes ou certaines régions. L'objectif principal de notre étude était donc d'estimer la prévalence du surpoids et de l'obésité au sein des Forces armées françaises en 2017. Matériel et méthode : Une étude descriptive transversale a été réalisée à partir de données issues du Logiciel Unique Médico-Militaire. Résultats : Après nettoyage, la base de données contenait 170 821 observations. Un échantillon aléatoire de 10% a été constitué pour l'analyse, soit 17082 personnes. L'IMC moyen était de 25,1 kg/m². 36,1 % des sujets étaient en surpoids et 9,6% étaient obèses. La catégorie professionnelle dans laquelle était retrouvée le plus d'obèses était celle des sous-officiers. C'était dans la Gendarmerie Nationale que l'IMC était le plus élevé avec la moitié du personnel en surcharge pondérale (50,1 %). Conclusion : L'armée française n'est pas épargnée par la pandémie mondiale de surpoids et d'obésité. La prévalence du surpoids au sein des Forces armées

françaises est comparable à celle de la population générale française. Cette étude a permis d'identifier les sujets les plus à risque de surcharge pondérale au sein des Forces armées françaises et permettra ainsi de cibler la prévention sur ces personnes. La prévention de la surcharge pondérale doit se faire dès l'incorporation des militaires et ne doit pas concerner uniquement le médecin des forces. Les personnels paramédicaux, l'encadrement sportif et le personnel de la restauration ont aussi leur rôle à jouer.

Sujet - Nom commun : Forces armées -- Soins médicaux -- Thèses et écrits académiques

Médecine militaire -- Thèses et écrits académiques

Obésité -- Thèses et écrits académiques

Surpoids -- Thèses et écrits académiques