

Notice pdf - Tabagisme chez les pompiers de Paris et compara____

Type de contenu : Texte

Type de médiation : sans médiation

Type de support : Volume

Titre(s) : Tabagisme chez les pompiers de Paris et comparaison selon le type de service (garde ou permanent) / par monsieur Bellakehal-Langlade Matthieu ; dirigée par le docteur Allonneau Alexandre

Est reproduit comme : Tabagisme chez les pompiers de Paris et comparaison selon le type de service (garde ou permanent) par monsieur Bellakehal-Langlade Matthieu 2021

Auteur(s) : Bellakehal-Langlade, Matthieu (1994-....)

Autre(s) auteur(s) : Allonneau, Alexandre (1984-....) médecin
Université Paris Cité 2019-....

Production : 2021

Description matérielle : 1 vol. (72 f.) : ill., carte ; 30 cm

Titre traduit ajouté par le catalogueur : Smoking among the Paris Fire Department and comparison according to the type of service (on-call or permanent) eng

Note sur les bibliographies et les index : Bibliogr. f. 53-59 (111 réf.)

Note sur le contenu : En appendice choix de documents, annexes

Note de thèses et écrits académiques : Thèse d'exercice Médecine Université Paris 2020

Résumé ou extrait : Introduction : Le tabagisme est l'une des principales causes de décès prématurés. Sa prévalence est plus importante dans les armées qu'en population nationale. L'objectif de notre étude était d'évaluer le tabagisme à la Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris notamment selon le type de service. Matériel et méthode : Nous avons inclus 283 pompiers entre septembre et novembre 2020. Les questionnaires ont été remis lors des visites de médecine du travail. Les variables recueillies étaient : socio-démographiques, type de service, mode de consommation, dépendance et tentatives de sevrage. Résultats : En 10 ans, la prévalence du tabagisme a été divisée par 2 (passant de 38 à 18%) à la Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris et était inférieure à celle des services départementaux d'incendie et de secours et de la population nationale. Parmi les fumeurs, 82% fumaient uniquement des cigarettes et la consommation journalière médiane était de 10 cigarettes. Des effets négatifs étaient décrits par 47% des fumeurs avec des essoufflements quasi-systématiques. Près des 2/3 souhaitaient arrêter et 16% n'avaient encore jamais essayé. La cigarette électronique constituait le moyen de sevrage principal, retrouvée chez

38% des anciens fumeurs et 10% des participants de l'étude l'utilisaient quotidiennement. Nous ne retrouvons pas de différence de consommation selon le type de service mais 57% augmentaient leur consommation au travail et 66% des fumeurs en système de garde fumaient au retour d'intervention. Conclusion : Le tabagisme chez les Sapeurs-Pompiers de Paris a fortement baissé en 10 ans mais reste un enjeu majeur. La compréhension des modes de consommations et de la population cible devraient permettre de réaliser des campagnes de préventions ciblées.

Sujet - Collectivité : Paris Département. Brigade de sapeurs-pompiers.

Sujet - Nom commun : Tabagisme

Forme, genre ou caractéristiques physiques : Thèses et écrits académiques