

## **Description de la perte d'effectifs (attrition) pour raison médicale en formation générale initiale de l'armée de terre**

Type de contenu : Texte

Type de médiation : sans médiation

Type de support : Volume

Titre(s) : Description de la perte d'effectifs (attrition) pour raison médicale en formation générale initiale de l'armée de terre : étude épidémiologique descriptive, rétrospective, multicentrique menée au cours de l'année 2016 / Claire Péral ; sous la direction de Thomas Colleony

Est reproduit comme : Description de la perte d'effectifs (attrition) pour raison médicale en Formation Générale Initiale de l'Armée de Terre

Auteur(s) : Péral, Claire (1990-....)

Autre(s) responsabilité(s) : Colleony, Thomas (1984-....) (Directeur de thèse)  
Université de Lorraine - Organisme de soutenance

Editeur, producteur : 2018

Description matérielle : 1 vol. (64 f.) ; 30 cm

Titre traduit ajouté par le catalogueur : Description of the loss of personnel (attrition) for medical reason in Initial General Training of the "Armée de Terre" descriptive, retrospective, multicentric epidemiological study conducted in 2016 eng

Note sur l'exemplaire : (BCSSA) Version électronique disponible au format pdf

Note sur les bibliographies et les index : Bibliogr. f. 58-62

Note de thèses et écrits académiques : Thèse d'exercice Médecine Université de Lorraine 2018

Résumé ou extrait : La perte d'effectif appelée "attrition médicale" est un réel problème dans les armées, surtout lors des premiers mois de service des personnels militaires. Pourtant l'Armée française manque de statistiques sur ce phénomène. Objectif : L'objectif de cette étude est de décrire les pathologies source de l'attrition médicale des recrues de l'Armée de Terre lors de leur formation générale initiale de douze semaines. Méthodes : Les données ont été collectées depuis les dossiers médicaux des recrues dont la formation a été arrêtée entre le 1er janvier et le 31 décembre 2016 au sein de cinq centres de formation initiale militaire. Résultats : Sur les 5785 recrues incorporées, 309 ont arrêté la formation sur décision médicale soit une attrition médicale de 5,3%. Les principales étiologies d'attrition médicale étaient les pathologies traumatiques avec 37,9% de blessures par surutilisation et 25,6% de blessure par traumatisme

aigu. Les membres inférieurs étaient la structure la plus touchée par les pathologies traumatiques avec 47,4% des localisations de blessures. Conclusion : l'attrition médicale est expliquée majoritairement par les traumatismes par surutilisation. Les blessures représentent l'élément le plus facilement modifiable pour diminuer l'attrition et préserver les effectifs. Un programme complet de prévention des blessures semblerait donc bénéfique pour l'Armée.

Sujet - Nom commun : Enseignement militaire -- Thèses et écrits académiques  
Militaires -- Démission -- Thèses et écrits académiques  
Sportifs -- Lésions et blessures -- Thèses et écrits académiques