

# **Épidémiologie microbienne des infections de kyste chez les patients atteints de polykystose rénale autosomique dominante et facteurs prédictifs de récurrence**

Type de contenu : Texte

Type de médiation : sans médiation

Type de support : Volume

Titre(s) : Épidémiologie microbienne des infections de kyste chez les patients atteints de polykystose rénale autosomique dominante et facteurs prédictifs de récurrence / Christelle Gallego ; sous la direction de Rozenn Le Berre

Est une reproduction de : Épidémiologie microbienne des infections de kyste chez les patients atteints de polykystose rénale autosomique dominante et facteurs prédictifs de récurrence Christelle Gallego Brest Université de Bretagne Occidentale 2021

Auteur(s) : Gallego, Christelle (1991-....)

Autre(s) auteur(s) : Le Berre, Rozenn (19..-....) médecin  
Université de Bretagne Occidentale 1971-....

Éditeur, producteur : Brest : Université de Bretagne Occidentale [diffusion/distribution], 2021

Description matérielle : 1 vol. (82 f.) : ill., tabl. ; 30 cm

Note sur disponibilité : Thèse confidentielle jusqu'au 01 Juin 2022

Note sur les bibliographies et les index : Bibliogr. p.62-68.

Note sur le contenu : Annexes

Note de thèses et écrits académiques : Thèse d'exercice Médecine. Immunologie Brest 2021

Résumé ou extrait : L'infection de kyste rénal ou hépatique est une des complications fréquentes des patients atteints de polykystose rénale autosomique dominante (PKRAD). Chez ces patients, toute fièvre associée à des douleurs abdominales et un syndrome inflammatoire biologique doit faire considérer la possibilité d'une infection de kyste, dont la prise en charge thérapeutique n'est pas clairement codifiée à l'heure actuelle. Les objectifs de cette analyse rétrospective observationnelle s'étant déroulée entre 01/1999 et 03/2020 dans les centres du Grand Ouest appartenant à la cohorte Genkyst sont de décrire les pathogènes responsables d'infection de kyste (rénal ou hépatique) chez des patients atteints de PKRAD, la prise en charge thérapeutique effectuée, le taux de guérison à 1 an ainsi que les facteurs prédictifs de récurrence d'infection de kyste. La prise en charge thérapeutique de ces épisodes infectieux kystiques est basée sur l'utilisation le plus souvent de fluoroquinolones ou de céphalosporines de 3<sup>e</sup> génération

(ceftriaxone ou céfotaxime) devant une prédominance de bacilles gram négatifs, pour une durée de 4 à 6 semaines, en adaptant la posologie à la fonction rénale du patient. En cas d'évolution clinique défavorable malgré un traitement anti-infectieux bien conduit, une prise en charge chirurgicale à type de kystectomie voire de néphrectomie/hépatectomie est envisageable. Les facteurs de risques prédictifs de récurrence d'infection de kyste potentielle sont une fièvre  $\geq 38^{\circ}\text{C}$ , la présence à l'ECBU du micro-organisme n'appartenant pas au groupe des bacilles gram négatifs ou une infection de kyste hépatique

Sujet - Nom commun : Bêta-lactamases à spectre étendu

Résistance aux antibiotiques

Récidive (médecine) -- Facteurs de risque

Forme, genre ou caractéristiques physiques : Thèses et écrits académiques