

Le haut risque d'apnée du sommeil

Titre(s): Le haut risque d'apnée du sommeil : étude préliminaire dans une population de sous-mariniens / François-Valéry Viard ; sous la direction du Médecin en Chef Philippe Clément

Auteur(s): Viard, François-Valéry (1986-....)

Autre(s) responsabilité(s): Clément, Philippe médecin militaire (1960-....) (Directeur de thèse)
Université Paris Descartes 1970-2019 - Organisme de soutenance
Université Paris Descartes, Faculté de médecine - Organisme de soutenance
Université Paris 13 - 985

Editeur, producteur: 2016

Description matérielle: 1 vol. (43 f.) ; 30 cm

Note sur l'exemplaire: Version électronique disponible au format pdf (BCSSA)

Note sur les bibliographies et les index: Bibliogr. f. 39-41 (33 réf.)

Note de thèses et écrits académiques: Thèse d'exercice Médecine 2016 Paris 5

Résumé ou extrait: Introduction : Le syndrome d'apnée hypopnée du sommeil (SAHOS) a une prévalence estimée en France à 4% chez les hommes et 2% chez les femmes. La capacité opérationnelle des sous-marins lanceur d'engin (SNLE) repose sur l'adéquation permanente entre son système d'arme et les opérateurs humains qui le met en oeuvre. Le SAHOS rend inapte à l'engagement dans la Marine Nationale. Objectifs : Etudier la prévalence du haut risque de SAHOS dans une population de marins à bord des SNLE et la comparer de la population générale. Etudier s'il existe un rapport entre la prévalence du haut risque de SAHOS et le type de poste, logistique ou opérationnel. Matériel et Méthode : étude observationnelle réalisée entre février 2016 et avril 2016 au centre médical des armées de Brest. 150 patients inclus (critères d'inclusions : marin opérant à bord d'un SNLE, >=18 ans, critères d'exclusion : âge