

Blessés de guerre français en Afghanistan

Titre(s): Blessés de guerre français en Afghanistan : de la blessure à la réinsertion : étude épidémiologique rétrospective d'une cohorte de 450 patients entre 2010 et 2012 : résultats préliminaires / Clément Hoffmann ; directeur de thèse : Stéphane de Rudnicki

Auteur(s): Hoffmann, Clément (1984-....)

Autre(s) responsabilité(s): Rudnicki, Stéphane de (Directeur de thèse)
Université Pierre et Marie Curie, UFR de médecine Pierre et Marie Curie Paris - Organisme de soutenance

Editeur, producteur: [S.l.] : [s.n.], 2014

Description matérielle: 1 vol. (299 p.) : ill. en coul. ; 30 cm

Titre traduit ajouté par le catalogueur: French combat casualties in Afghanistan from battle injury to reintegration a retrospective epidemiological study of a cohort of 450 patients conducted between 2010 and 2012 preliminary results eng

Note sur l'exemplaire: Version électronique disponible au format pdf (BCSSA)

Note sur les bibliographies et les index: Bibliogr. 5 p.

Note de thèses et écrits académiques: Thèse d'exercice Médecine. Anesthésie-Réanimation 2014 Paris 6

Résumé ou extrait: L'objectif de l'étude était de décrire la prise en charge des militaires français blessés par armes à feu (AF), engins explosifs (EE) et/ou accidents de transport militaires (ATM) et leur devenir. Patients et Méthodes : Analyse rétrospective, sur une période de 3 ans, des données provenant des recueils médicaux du Service de Santé des Armées (SSA). Résultats : 450 patients ont été inclus entre 2010-2012. 61 % ont été blessés par EE, 28 % par AF et 11 % par ATM. L'ISS médian était de 3 [2 - 10] (ISS > 15 pour 84 patients). Les régions anatomiques lésées étaient les membres (67 %), la région tête/cou (55 %) et le tronc (42 %). 191 patients (42 %) ont été rapatriés en France. La létalité des blessures était de 11,3 % (51/450). Au rôle 3, 55% (169/307) des patients ont été opérés et 18 % (54/307) transfusés. Les principales complications étaient les états de stress post-traumatiques (41 % ; 164/399), les douleurs chroniques (29 % ; 115/399) et les infections (12 % ; 48/399). A 2 ans, 95 % des blessés (380/399) étaient toujours militaires et 93 % (373/399) avaient repris une activité professionnelle. Discussion : Le blessé de guerre des conflits modernes, tel l'Afghanistan, présente des traumatismes multiples et complexes, souvent graves, à l'origine de séquelles sévères nécessitant une prise en charge multidisciplinaire et intégrative. La prise en charge des états de stress post-traumatiques et des douleurs chroniques ainsi que l'accompagnement du militaire blessé et de sa famille doivent rester une priorité et s'inscrire dans la durée. Le SSA apparaît aujourd'hui seul capable d'assurer cette mission et donc de répondre au besoin opérationnel des forces.

Sujet - Nom commun : Secours aux militaires blessés ou malades en temps de guerre -- Thèses et écrits académiques

Afghanistan -- 2001-.... (Guerre d'Afghanistan) -- Participation française -- Thèses et écrits académiques

Médecine militaire -- Thèses et écrits académiques

Épidémiologie -- Thèses et écrits académiques