

La consultation au SAU peut-elle être un moment privilégié de détection et d'information sur le problème de dépendance aux benzodiazépines ?

Titre(s) : La consultation au SAU peut-elle être un moment privilégié de détection et d'information sur le problème de dépendance aux benzodiazépines ? [Texte imprimé] / par Frédérique Duval ; sous la direction de Dominique Vallet

Est reproduit comme : La consultation au SAU peut-elle être un moment privilégié de détection et d'information sur le problème de dépendance aux benzodiazépines?

Auteur(s) : Duval, Frédérique (1978-....)

Autre(s) responsabilité(s) : Vallet, Dominique (1954-....) (Directeur de thèse)
Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC) - Organisme de soutenance
UPEC, Faculté de médecine - Organisme de soutenance

Éditeur, producteur : [S.l.] : [s.n.], 2011

Description matérielle : 1 vol. (69 f.) ; 30 cm

Titre traduit ajouté par le catalogueur : Is the consultation at the emergency a good time to detect and inform about the addiction of BZD? eng

Note sur le titre et les responsabilités : SAU : service d'accueil aux urgences

Note sur les bibliographies et les index : Bibliogr. f. 58-62

Note de thèses et écrits académiques : Thèse d'exercice Médecine 2011 Paris-Est Créteil

Résumé ou extrait : La consultation au SAU peut-elle être un moment privilégié de détection et d'information sur le problème de dépendance aux benzodiazépines ? RÉSUMÉ : Les prescriptions de BZD sont très courantes en médecine générale et posent le problème de la dépendance. À l'aide d'une étude prospective sur 3 mois incluant les patients consultant au SAU de l'HIA Bégin et déclarant une consommation de BZD, nous avons étudié leur consommation et leur éventuelle dépendance aux BZD. Nous nous sommes aussi penchés sur le type de prise en charge par le médecin du SAU. Nous avons inclus 101 patients dont 13% étaient dépendants aux BZD. Les médecins consultant au SAU ont été sensibilisés au repérage de la dépendance aux BZD même s'ils reconnaissent que la structure du SAU se prête mal à la prise en charge globale de ce problème. La consultation au SAU peut donc seulement être un moment de détection et d'information sur la dépendance aux BZD, le relais doit rapidement être pris par le médecin traitant généraliste.

The BZD prescriptions are very common in generalist medicine and we have to ask about the addiction. With a prospective study during 3 months including all patients consulting in emergency of the HIA Bégin and declaring BZD consumption, we studied their consumption and, eventually, their addiction of BZD. We also studied the works of the doctor of the emergency. We have included 101 patients whose

13% were addicted. Doctors consulting in the emergency were increased awareness of the addiction of BZD even if they admit that this service is not the better place for a global issue, the generalist may take over from the urgentist.

Sujet - Nom commun : Benzodiazépines -- Thèses et écrits académiques
Hôpitaux -- Services des urgences -- Thèses et écrits académiques