

Bilan de santé périodique chez des officiers supérieurs

Type de contenu : Texte

Type de médiation : sans médiation

Type de support : Volume

Titre(s) : Bilan de santé périodique chez des officiers supérieurs : évaluation des pratiques médicales / Estelle Jammot,... ; sous la direction du professeur Thierry Carmoi

Est une reproduction de : Bilan de santé périodique chez des officiers supérieurs : évaluation des pratiques médicales Estelle Jammot 2018

Auteur(s) : Jammot, Estelle (1991-....)

Autre(s) auteur(s) : Carmoi, Thierry (1965-....)

Aix-Marseille Université 2012-....

Aix-Marseille Université Faculté de médecine 2012-2018

Production : 2018

Description matérielle : 1 vol. (97 f.) : ill. ; 30 cm

Note sur l'exemplaire : (BCSSA) Version électronique disponible au format pdf

Note sur les bibliographies et les index : Bibliogr. f. 83-87

Note de thèses et écrits académiques : Reproduction de Thèse d'exercice Médecine Aix-Marseille 2018
Reproduction de Mémoire de DES Médecine générale Aix-Marseille 2018

Résumé ou extrait : Introduction : L'examen périodique de santé systématique suscite toujours le débat quant à son bénéfice. Les officiers-supérieurs d'Ile-de-France en bénéficient au cours de leur visite médicale périodique (VMP) à l'Hôpital d'Instruction des Armées du Val-de-Grâce. L'objectif était de déterminer si leur état de santé justifiait d'une surveillance différant des recommandations nationales. Matériel et méthodes : Une étude rétrospective, monocentrique et descriptive a été réalisée. Pour être inclus, le patient devait avoir réalisé une ou plusieurs VMP associées à un bilan complémentaire (audiogramme, ophtalmologique, biologique, ...) entre janvier 2007 et décembre 2015, à l'exclusion des préfets. Résultats : 378 dossiers-patients ont été inclus pour un total de 1276 dossiers cliniques et 1215 dossiers biologiques étudiés. L'âge moyen était de 53,0 ans (\pm 5,6 ans). La prévalence des IDM dans notre étude était similaire à celle de la population générale (17/1276 versus 780000/66millions (M), $p = 0.61$). Il existait une différence significative de la prévalence de l'HTA dans notre population par rapport à la population de la même tranche d'âge (8,7% -112/1276- versus 23,5% -4M/17M-, p

Sujet - Collectivité : Hôpital d'instruction des armées du Val-de-Grâce Paris. 1793-2016.

Sujet - Nom commun : Bilans de santé

Dépistage

Médecine militaire

Forme, genre ou caractéristiques physiques : Thèses et écrits académiques