

## **Evaluation des troubles vésico-sphinctériens et leurs complications chez des patients atteints de sclérose en plaques**

Type de contenu : Texte

Type de médiation : sans médiation

Type de support : Volume

Titre(s) : Evaluation des troubles vésico-sphinctériens et leurs complications chez des patients atteints de sclérose en plaques : étude d'une cohorte de 436 patients de l'hôpital Raymond Poincaré / Alix Verrando ; sous la direction de Djamel Bensmail

Est reproduit comme : Evaluation des troubles vésico-sphinctériens et leurs complications chez des patients atteints de sclérose en plaques

Auteur(s) : Verrando, Alix (1989-?.)

Autre(s) responsabilité(s) : Bensmail, Djamel (1971-....) (Directeur de thèse)  
UPEC, Faculté de médecine - Organisme de soutenance

Editeur, producteur : 2018

Description matérielle : 1 vol. (94 f.) ; 30 cm

Titre traduit ajouté par le catalogueur : Evaluation of lower urinary tract symptoms and their complications for patients with multiple sclerosis. Study of a cohort of 436 patients at Raymond Poincaré Hospital eng

Note sur l'exemplaire : (BCSSA) Version électronique disponible au format pdf

Note sur les bibliographies et les index : Bibliogr. f. 84-91

Note de thèses et écrits académiques : Thèse d'exercice Médecine UPEC 2018

Résumé ou extrait : Introduction : Le retentissement et la prise en charge des troubles du bas appareil urinaire chez les patients atteints de sclérose en plaques (SEP) à un stade avancé de la maladie sont peu décrits dans la littérature. Notre objectif a été de les analyser dans la cohorte de patients SEP suivis à l'hôpital Raymond Poincaré. Matériels et Méthodes : Tous les patients SEP suivis en rééducation pour des troubles du bas appareil urinaire ont été inclus après exclusion des patients avec trop de données manquantes. Nous avons évalué l'impact du stade évolutif de la SEP sur la gestion du mode mictionnel et les complications uro-néphrologiques en les séparant en trois groupes (EDSS (Expanded Disability Status Score) 7,5 : groupe 3). Résultats : 436 patients ont été inclus dont 193 dans le groupe 3. L'âge moyen des patients et la durée d'évolution étaient respectivement 58,9 (+/-10,5) et 19,9 (+/-10,3) ans. L'EDSS

médian était à 7 (IQ 6-8). Les patients du groupe 3 étaient plus à risque de complications (lithiases OR 2,54 (IC 95% 1,43-4,52 ; p=0,002), insuffisance rénale OR 2,17 (IC 95% 1,27-3,72 ; p=0,005), infections urinaires fébriles OR 3,54 (IC 95% 1,91-6,58 ; p