

Epidemiologie des brûlures de l'enfant en milieu hospitalier

Titre(s): Epidemiologie des brûlures de l'enfant en milieu hospitalier [Ressource électronique] : à propos de 2760 enfants brûlés pris en charge par la brigade des sapeurs-pompiers de Paris / Audrey Sacksteder-Delbart ; [sous la direction de Jean-Luc Fortin]

Auteur(s): Sacksteder-Delbart, Audrey (1979-....)

Autre(s) responsabilité(s): Fortin, Jean-Luc (1962-....) (Directeur de thèse)
Université de Nancy I, Faculté de médecine - Organisme de soutenance

Editeur, producteur: [S.l.] : [s.n.], 2008

Description matérielle: 1 disque optique numérique (CD-Rom) : ill. ; 12 cm

Titre traduit ajouté par le catalogueur: Epidemiology of child burns injuries in prehospital care About 2760 children burned taken care by the Brigade emergency service of Paris eng

Note sur les bibliographies et les index: 81 réf. bibliogr.

Note de thèses et écrits académiques: Thèse d'exercice Médecine 2008 Nancy 1 Reproduction de

Résumé ou extrait: Cette étude prospective fait l'analyse de 2760 cas d'enfants brûlés entre 0 et 15 ans pris en charge par la Brigade des Sapeurs Pompiers de Paris (BSPP) de 1994 à 2003 à Paris et en Petite Couronne. RESULTATS : L'âge moyen de l'enfant brûlé est de 5 ans. Le pic de survenue est à 2 ans et 57% des victimes ont 4 ans ou moins. Le sex-ratio est de 1,36. Il existe des pics de survenue des brûlures au moment de la préparation des repas : entre 10 heures et 15 heures (27,31% des brûlures) et un deuxième entre 17 heures et 22 heures (31,2% des brûlures). L'agent vulnérant le plus souvent en cause est l'eau chaude (80%), suivi du feu (10%). Le lieu de survenue le plus fréquent est le salon (38,4%), et la chambre à coucher (25,1%). L'incidence moyenne annuelle sur la population totale est de 4,48 enfants brûlés pour 100 000 habitants. Rapportée à la population pédiatrique on a une incidence pour 100 000 enfants de 29,8 à Paris, de 19,9 dans les Hauts-de-Seine, de 29,5 en Seine-Saint-Denis et de 23,1 dans le Val-de-Marne. La mortalité moyenne est de 3,6 enfants/an et la létalité moyenne s'élève à 1,3%. L'évolution du nombre d'enfants brûlés pris en charge par la BSPP est constante sur les dix ans d'étude. On a une multiplication par 1,8 du nombre d'enfants brûlés en dix ans. Sur l'ensemble des enfants brûlés 18,2% ont été laissés à domicile, 11,2% ont été conduits dans des centres de brûlés, 66,7% ont été amenés aux urgences générales. CONCLUSION : La brûlure de l'enfant est un des accidents domestiques encore en augmentation constante depuis dix ans. L'eau chaude est le principal agent vulnérant. Le lieu de survenue le plus fréquent est le salon. Les départements les plus touchés sont Paris et la Seine-Saint-Denis. Un renforcement des mesures de prévention s'impose.

Type de ressource électronique: Type de fichier : PDF

Configuration requise: Configuration requise : Lecteur de fichier

Sujet - Collectivité :

Sujet - Nom commun : Brûlures chez l'enfant -- Épidémiologie -- Thèses et écrits académiques
Brûlures chez l'enfant -- Thérapeutique -- Thèses et écrits académiques