

Impact du visionnage d'images violentes sur l'émergence de trouble de stress post-traumatique dans une population de militaires français

Type de contenu : Texte

Type de médiation : sans médiation

Type de support : Volume

Titre(s) : Impact du visionnage d'images violentes sur l'émergence de trouble de stress post-traumatique dans une population de militaires français / Laura Le Bair ; sous la direction de Jean-Marc Boissy

Est une reproduction de : Impact du visionnage d'images violentes sur l'émergence de trouble de stress post-traumatique dans une population de militaires français Laura Le Bair 2019

Auteur(s) : Le Bair, Laura (1992-....)

Autre(s) auteur(s) : Boissy, Jean-Marc (1973-....)

Université Claude Bernard Lyon 1971-....

Production : 2019

Description matérielle : 1 vol. (89 p.) : graph., tableaux ; 30 cm

Note sur les bibliographies et les index : Bibliogr. p. 75-79 (57 réf.)

Note sur le contenu : En appendice, choix de documents, annexes

Note de thèses et écrits académiques : Reproduction de Thèse d'exercice Médecine Lyon 1 2019

Résumé ou extrait : La cyber-défense a pris une place importante dans les stratégies de surveillance et de défense de l'armée française. Il a été créé des cellules de veille internet effectuant une surveillance continue sur les réseaux sociaux et les sites de propagandes djihadistes à la recherche d'informations. Ce travail expose les participants à des contenus potentiellement violents qui peuvent avoir des conséquences au niveau psychologique, notamment le développement de trouble de stress post-traumatique (TSPT). Notre travail a pour objectif principal d'évaluer la prévalence de TSPT dans cette population militaire au travers du questionnaire PCL-5, puis d'étudier les facteurs de risques de TSPT et d'analyser le suivi médical proposé. Il s'agit d'une étude épidémiologique de type observationnelle rétrospective. Les données ont été collectées entre le 23 novembre 2018 et le 30 avril 2019 par le biais d'un questionnaire, support du suivi médical obligatoire des veilleurs, archivé dans le logiciel unique médico-militaire (LUMM). La prévalence de TSPT est de 3.3% dans la population de veilleurs. Ce qui a particulièrement choqué les veilleurs sont les vidéos et le visionnage de décapitation. Les facteurs de risques de TSPT retenus comme significatifs sont le fait d'avoir rencontré un évènement traumatisant hors du travail ($p=0.04$) et le fait de ne pas avoir été informé du type de mission ($p=0.02$). Le suivi proposé pendant la

mission a été qualifié de suffisant par 74.2% des participants. Le suivi post mission normalement obligatoire a été reçu par 37.5% des participants. La prévalence de TSPT reste faible dans notre population d'étude en comparaison aux militaires exposés directement à la violence. Des mesures de prévention devraient être développées afin de réduire d'avantage le développement de TSPT ; telles que, contre indiquer à la mission les personnes présentant un antécédent de TSPT, recruter des personnes spécialistes du renseignement, prévenir les veilleurs en amont du type de mission. Concernant le suivi post mission, il est nécessaire de renforcer le dialogue entre la cellule de veille internet et les centres médicaux des armées de rattachement pour assurer une bonne continuité du suivi psychologique.

Sujet - Nom commun : État de stress post-traumatique
Militaires

Forme, genre ou caractéristiques physiques : Thèses et écrits académiques