

## **Asthme avec atteinte prédominante des voies aériennes distales**

Titre(s) : Asthme avec atteinte prédominante des voies aériennes distales : un phénotype original /  
Benjamin Delcasso ép. Seisson ; sous la direction de Gilles Devouassoux

Est reproduit comme : Asthme avec atteinte prédominante des voies aériennes distales

Auteur(s) : Delcasso, Benjamin (1989-....)

Autre(s) responsabilité(s) : Devouassoux, Gilles (1965-....) (Directeur de thèse)  
Université Claude Bernard Lyon - Organisme de soutenance

Editeur, producteur : [Lieu de publication inconnu] : [éditeur inconnu], 2016

Description matérielle : 1 vol. (45 f.) ; 30 cm

Note sur l'exemplaire : Version électronique disponible au format pdf (BCSSA)

Note sur les bibliographies et les index : Bibliogr. f. 41-45

Note de thèses et écrits académiques : Thèse d'exercice Médecine 2016 Lyon 1

Résumé ou extrait : Les voies aériennes distales (VAD) sont responsables de moins de 25 % des résistances totales chez un sujet sain et sont le principal site d'obstruction chez l'asthmatique (plus de 50 % des résistances totales). L'asthme est une maladie hétérogène et plusieurs phénotypes ont été décrits. A ce jour, l'exploration fonctionnelle respiratoire est peu prise en compte dans ces évaluations phénotypiques et l'analyse des petites voies aériennes n'a pas été étudiée. L'objectif de cette étude est d'analyser les caractéristiques phénotypiques de l'asthme avec atteinte des VAD. Notre étude rétrospective s'est déroulée entre novembre 2014 et avril 2015, au sein de 2 services de pneumologie français. Un asthme avec atteinte des VAD était défini par :  $VEMS/CVF = 70 \%$ ,  $VEMS = 80 \%$  de la théorique et soit  $VR > \text{valeur prédite} + 1,64 \text{ RSD}$ , soit DEM50

Sujet - Nom commun : Asthme -- Thèses et écrits académiques  
Bronchioles -- Thèses et écrits académiques