

## **Stratégie du cocooning**

Titre(s) : Stratégie du cocooning : comparaison de deux pratiques professionnelles dans une maternité de la région parisienne / Roland Patricelli ; sous la direction de Patrick Imbert

Auteur(s) : Patricelli, Roland (1987-....)

Autre(s) responsabilité(s) : Imbert, Patrick (1956-....) (Directeur de thèse)  
Université Paris 13 - Organisme de soutenance

Editeur, producteur : 2016

Description matérielle : 1 vol. (44-VI-[15] f.) : tabl., graph. ; 30 cm

Note sur l'exemplaire : Version électronique disponible au format pdf (BCSSA)

Note sur les bibliographies et les index : Bibliogr. f. I-VI

Note de thèses et écrits académiques : Thèse d'exercice Médecine. Médecine générale 2016 Paris 13

Résumé ou extrait : Introduction. La coqueluche est une maladie grave chez le jeune nourrisson. Sa prévention fait appel au "cocooning" qui repose sur la vaccination de son entourage, notamment ses parents. Notre objectif était de comparer deux stratégies vaccinales visant à améliorer l'efficacité du cocooning en maternité, et d'identifier des facteurs de couverture vaccinale (CV) insuffisante. Méthodes. De février à novembre 2013, nous avons réalisé à la maternité l'hôpital Bégin, en région parisienne, une étude prospective pragmatique répartie en deux périodes successives. Les parents non à jour recevaient une ordonnance pour une vaccination en ville (groupe A) ou bien étaient vaccinés en maternité (groupe B). Leur statut vaccinal était ensuite recueilli par téléphone jusqu'à six mois après l'accouchement. Résultats. Le groupe A (n=201) et le groupe B (n=198) avaient des caractéristiques comparables, dont la CV initiale (moyenne : 38%). À 1 et 6 mois, la CV du groupe B était significativement supérieure à celle du groupe A, respectivement 78% versus 61% (p