

## **Intérêt du dépistage systématique de la protéinurie en médecine d'unité**

Titre(s) : Intérêt du dépistage systématique de la protéinurie en médecine d'unité [Texte imprimé] / Alexis Marcelko ; sous la direction de Laurent Papillault des Charbonneries

Auteur(s) : Marcelko, Alexis (1986-....)

Autre(s) responsabilité(s) : Papillault des Charbonneries, Laurent (1969-....) (Directeur de thèse)  
Aix-Marseille Université (2012-....) 2012-.... - Organisme de soutenance  
Aix-Marseille Université, Faculté de médecine 2012-2018 - Organisme de soutenance

Editeur, producteur : [S.l.] : [s.n.], 2012

Description matérielle : 1 vol. (37 f.) ; 30 cm

Titre traduit ajouté par le catalogueur : Interest of systematic screening for proteinuria in military medicine eng

Note sur la description bibliographique : Présenté sous la forme de Thèse-article soumis au comité de rédaction de la "Presse Médicale"

Note sur les bibliographies et les index : Bibliogr. p.28-30 ; 39 réf.

Note de thèses et écrits académiques : Thèse d'exercice Médecine. DES de médecine générale 2012 Aix Marseille Université

Résumé ou extrait : INTRODUCTION?: La bandelette urinaire (BU) est un moyen de détecter la présence de protéinurie, témoin fréquent d'une lésion rénale organique, comme l'insuffisance rénale chronique. L'objectif de l'étude est de connaître l'intérêt de la détection de la protéinurie, de façon systématique et annuelle, par les médecins généralistes militaires. METHODE?: Enquête descriptive prospective sur 10 mois. Tous les sujets inclus ont bénéficié d'une BU. Le questionnaire comportait 3 parties?: les caractéristiques sociodémographiques, les activités physiques du patient et un résumé clinique. Lorsqu'une protéinurie était isolée à la BU, un sédiment urinaire et le rapport protéinurie/créatininurie (Uprot/créat) étaient réalisés. Les données étaient analysés et interprétés par le logiciel EPI INFO version 3.5.1. RESULTATS: Sur 510 patients inclus, 87 ont présenté une protéinurie isolée. L'étude du sédiment urinaire de ces 87 patients était normal. L'étendue d'Uprot/créat était de 0,03 à 0,29 avec une médiane de 0,06?; IQ [0,04?; 0,08]. Les habitudes tabagiques n'étaient pas différents (p=0,2). L'existence d'une protéinurie antérieure était significative sur la présence d'une protéinurie (p