

## **Retour à l'emploi et résultats fonctionnels des militaires français après ligamentoplastie de cheville**

Type de contenu : Texte

Type de médiation : sans médiation

Type de support : Volume

Titre(s) : Retour à l'emploi et résultats fonctionnels des militaires français après ligamentoplastie de cheville / Mélody Goncalves ; dirigée par M. le Docteur Nicolas de l'Escalopier

Est reproduit comme : Retour à l'emploi et résultats fonctionnels des militaires français après ligamentoplastie de cheville Mélody Goncalves 2024

Auteur(s) : Goncalves, Mélody

Autre(s) auteur(s) : Escalopier, Nicolas de l' (1988-....)  
Université Paris Cité 2019-....

Diffusion / Distribution : 2024

Description matérielle : 1 vol. (114 f.) : ill. en coul. ; 30 cm

Note sur les bibliographies et les index : Bibliogr. f. 83-93. Annexes

Note sur le contenu : En appendice, choix de documents

Note de thèses et écrits académiques : Thèse d'exercice Médecine Université Paris Cité 2024

Résumé ou extrait : Introduction : Conséquence directe des entorses, l'instabilité latérale chronique de cheville a une incidence particulièrement élevée chez les militaires français chez qui elle entraîne une inaptitude à l'emploi. La prise en charge chirurgicale de cette instabilité chronique est associée à de bons résultats fonctionnels dans la population générale. Aucune étude française ne s'est intéressée aux résultats dans une population spécifiques de militaires. Notre objectif est d'évaluer le délai de retour à l'emploi ainsi que le niveau d'aptitude post opératoire après ligamentoplastie de cheville chez les militaires français. Matériel et méthodes : Il s'agit d'une étude rétrospective, multicentrique incluant les militaires français opérés d'une instabilité chronique latérale de la cheville entre janvier 2015 et décembre 2021 au sein de trois hôpitaux d'instruction des armées. Les critères évalués étaient le retour à l'emploi et son délai, la reprise sportive, les résultats fonctionnels par les scores FAOS, EQ-5D-5L et l'Ankle Activity score ainsi que le taux de récurrence au dernier recul. Résultats : Soixante-sept patients ont été inclus dans l'étude avec un recul médian de 49 mois. Soixante-sept pourcent avaient récupéré leurs aptitudes initiales au dernier recul, 78% une aptitude opérationnelle et 63% avaient repris une activité physique régulière. Quinze patients (22%) n'ont pas récupéré d'aptitude opérationnelle. Le délai médian

de récupération des aptitudes initiales était de 5,97 mois (IQR=3,57) et 75% des patients les avaient récupérées avant 7,57 mois. Le score FAOS post-opératoire médian était de 90 (IQR=21,25). Trente-trois pourcent des patients opérés ont présenté un nouvel épisode d'instabilité. Conclusion : Notre étude confirme l'efficacité de la chirurgie dans cette population spécifique tant sur le retour à l'emploi qu'au niveau des résultats fonctionnels. Une attention particulière doit être portée sur la rééducation post opératoire et la prévention secondaire compte tenu du risque important de récurrence.

Sujet - Nom commun : Ligamentoplastie

Militaires

Cheville (anatomie)

Forme, genre ou caractéristiques physiques : Thèses et écrits académiques