

Antibiorésistance des germes urinaires chez les militaires français et leur famille

Type de contenu : Texte

Type de médiation : b

Type de support : Ressource dématérialisée

Titre(s) : Antibiorésistance des germes urinaires chez les militaires français et leur famille : étude observationnelle au GMC Bouffard-Djibouti / Louise Audemard d'Alançon épouse Prieur ; sous la direction d'Hélène Vanquaethem

Est reproduit comme : Antibiorésistance des germes urinaires chez les militaires français et leur famille étude observationnelle au GMC Bouffard-Djibouti Louise Audemard d'Alançon épouse Prieur 2019 1 vol. (87 f.)

Auteur(s) : Audemard d'Alançon, Louise (1991-....)

Autre(s) auteur(s) : Université Claude Bernard Lyon 1971-....

Production : 2019

Note sur le titre et les responsabilités : Titre provenant de l'écran-titre

Note sur la description matérielle : L'impression du document génère 90 p.

Note sur les bibliographies et les index : Bibliogr. f. 78-82

Note de thèses et écrits académiques : Thèse d'exercice Médecine Lyon 1 2019

Résumé ou extrait : Les infections urinaires sont un des premiers motifs de consultation et un des premiers recours à un traitement antibiotique. Il n'existe pas de données sur l'antibiorésistance des germes urinaires sur le territoire djiboutien, où sont déployés de nombreux militaires français chaque année. L'objectif de notre étude est de décrire les profils d'antibiorésistance des germes urinaires retrouvés chez les militaires français et leur famille au groupement médico-chirurgical Bouffard à Djibouti. Une étude épidémiologique descriptive rétrospective a été réalisée du 01/09/2015 au 15/02/2016. Tous les examens cytotobactériologiques des urines (ECBU) prélevés auprès des militaires français ou de leur famille à l'occasion d'une consultation ou d'une hospitalisation au GMC Bouffard, mettant en évidence un germe unique ont été inclus. Un antibiogramme a été réalisé selon les techniques habituelles avec interprétation sur un automate, le SirScan (i2a®). Nous avons inclus 28 patients ayant bénéficié d'un ECBU, 25 mettant en évidence un bacille Gram négatif (BGN) (vingt Escherichia coli, quatre Klebsiella pneumoniae et un Pseudomonas aeruginosa) et trois cocci Gram positif (CGP) (un Staphylococcus aureus, un Staphylococcus simulans et un Enterococcus faecalis). Tous les E. coli ont été retrouvés résistants à l'amoxicilline, tous les BGN étaient résistants à l'amoxicilline-acide clavulanique, et 20% des BGN

étaient résistants au céfotaxime. Trois ECBU ont mis en évidence une bêta-lactamase à spectre étendu (BLSE), uniquement produite par des souches d'E. coli. Notre étude confirme l'existence d'un profil d'antibiorésistance particulier au sein de cette population spécifique, très différent des profils rencontrés en France, mais plus similaires aux profils décrits sur le continent africain. Cela implique une vigilance particulière des médecins militaires projetés à Djibouti dans le traitement probabiliste des infections urinaires. Une étude descriptive à plus grande échelle, sur plusieurs sites d'opérations extérieures paraît nécessaire pour valider un schéma thérapeutique standardisé pour les militaires projetés sur le continent africain

Configuration requise : Nécessite un navigateur internet ; un lecteur de fichier PDF

Sujet - Nom commun : Appareil urinaire -- Infections -- Djibouti
Résistance aux antibiotiques -- Djibouti
Militaires
Médecine militaire

Forme, genre ou caractéristiques physiques : Thèses et écrits académiques

Adresse électronique et mode d'accès : <https://n2t.net/ark:/47881/m6r78dhp>||Accès au texte intégral
https://www.gedissa.org/main/document/showinframes.php?cidReq=BCSSA&id_session=0&gidReq=0&gradebook=0&origin=&id=111869||