

L'incidence des ALD 30 chez les militaires d'active entre 2005 et 2011

Titre(s): L'incidence des ALD 30 chez les militaires d'active entre 2005 et 2011 [Texte imprimé] / Enguerrane Martinez-Lorenzi ; sous la direction de Guillaume Desjeux

Auteur(s): Martinez-Lorenzi, Enguerrane (1986-....)

Autre(s) responsabilité(s): Desjeux, Guillaume (1964-....) (Directeur de thèse)
Aix-Marseille Université (2012-....) - Organisme de soutenance
Aix-Marseille Université, Faculté de médecine 2012-2018 - Organisme de soutenance

Editeur, producteur: [S.l.] : [s.n.], 2013

Description matérielle: 1 vol. (32 f.) ; 30 cm

Titre traduit ajouté par le catalogueur: Incidence of thirty long-term diseases of french armed forces between 2005 and 2011 eng

Note(s): Thèse présentée sous la forme de thèse-article
Thèse soumise au comité de rédaction de la revue "Santé Publique"

Note sur les bibliographies et les index: Bibliogr. f. 21-22 ; 17 réf.

Note de thèses et écrits académiques: Thèse d'exercice Médecine. DES de médecine générale 2013 Aix-Marseille

Résumé ou extrait: **OBJECTIFS?**: connaître l'indice des affections de longue durée (ALD 30) entre 2005-2011 chez les militaires. **METHODES?**: Etude descriptive pour les militaires d'active protégés par la caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) entre le 01/01/2005 et le 31/12/2011. L'indice des ALD30 a été analysée à partir des données médicales enregistrées par les médecins-conseils via la base de données HIPPOCRATE. Une standardisation a été réalisée en raison de la surreprésentation des hommes et des adultes jeunes. **RESULTATS?**: La population annuelle moyenne était de 331 000 personnes. Au cours de l'étude, 10 107 militaires ont bénéficié d'une exonération du ticket modérateur pour 11 581 ALD accordées. L'âge moyen était 43,2 ans et 87,9% des patients étaient des hommes. Les affections les plus incidentes étaient les affections cardiovasculaires qui représentaient 29,8% des ALD, les tumeurs malignes (24,3%), le diabète (14,8%) et les affections psychiatriques (8,6%). Les taux d'incidence standardisés sur l'âge des femmes étaient supérieurs à celui des hommes (501 vs 462 p.100 000). L'Armée de Terre avait le taux standardisé d'incidence d'ALD le plus élevé, la Marine le plus bas (1 139 vs 768 p.100 000). En comparant avec les données d'incidence du régime général, à âge et sexe égaux, les militaires étaient presque toujours en sous-risque pour les ALD, pouvant s'expliquer par la sélection médicale, l'activité et l'affiliation de courte durée à la CNMSS. **CONCLUSION?**: les données issues des ALD sont utiles pour les études épidémiologiques et l'évaluation des programmes de santé et de prévention.

Sujet - Nom commun : Affections de longue durée -- Forces armées -- Thèses et écrits académiques
Maladies chroniques -- Forces armées -- Thèses et écrits académiques
Médecine militaire -- Thèses et écrits académiques