

Évaluation de l'incidence de la demande en soin d'addictologie par l'entretien d'addictologie réalisé à l'unité d'hospitalisation de courte durée en post-alcoolisation

Titre(s) : Évaluation de l'incidence de la demande en soin d'addictologie par l'entretien d'addictologie réalisé à l'unité d'hospitalisation de courte durée en post-alcoolisation : une étude prospective randomisée / Rachel Borowko,... ; sous la direction du professeur Michel Walter et du médecin en chef Anne Le Coat

Auteur(s) : Borowko, Rachel (1988-....)

Autre(s) responsabilité(s) : Walter, Michel psychiatre (1958-....) (Directeur de thèse)
Le Coat, Anne (1971-....) (Directeur de thèse)
Université de Bretagne occidentale - Organisme de soutenance
Université de Bretagne occidentale, UFR de médecine - Organisme de soutenance

Editeur, producteur : 2017

Description matérielle : 1 vol. (35 f.) ; 30 cm

Titre traduit ajouté par le catalogueur : Evaluation of the impact of addictology interview on the demand for addictology care in patient after acute alcoholisation a randomized prospective study eng

Note sur l'exemplaire : Version électronique disponible au format pdf (BCSSA)

Note sur les bibliographies et les index : Bibliogr. f. 33-34 (29 réf.)

Note de thèses et écrits académiques : Thèse d'exercice Médecine 2017 Brest

Résumé ou extrait : Addictive alcohol consumption in France is a major public health issue. According to guidelines, any patient consulting for acute alcoholism should ideally meet an addictology specialist but not all structures have a specialised addictology team. Our objective was to evaluate the impact of an "addictology" interview in sobering patients hospitalised in emergency departments on the demand for addictive care. Our study did not find any positive impact on the demand for addictology care in patients who had an "addictology" interview compared to patients receiving only written information about care structures. However, when analysing the interviews, patients who had previous contact with an addictology team were more likely to agree to receive treatment following their consultation to the emergency department (OR = 18.6 95% CI [1.8 977.6], p = 0.003). In order to optimise the management of addiction in patients after acute alcoholisation, standardised written information should be given to all patients. The collaboration with teams specialised in addictology will improve the quality of the interviews and thus confirm by a future study the relevance of these recommendations and to validate the evolution of practices in the care of patients after acute alcoholisation.

Sujet - Nom commun : Addictologie -- Thèses et écrits académiques
Alcoolisme -- Thérapeutique

Centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie -- Thèses et écrits académiques

Toxicomanie -- Thérapeutique -- Thèses et écrits académiques