

Prise en charge des luxations d'épaule aux urgences de l'hôpital Robert Picqué en 2013

Titre(s) : Prise en charge des luxations d'épaule aux urgences de l'hôpital Robert Picqué en 2013 : épidémiologie, suivi et évaluation du déficit fonctionnel à un an / Mademoiselle Garrigues Marion,... ; directeur de thèse, Monsieur le Docteur Allizard Michel

Est reproduit comme : Prise en charge des luxations d'épaule aux urgences de l'hôpital Robert Picqué en 2013 : épidémiologie, suivi et évaluation du déficit fonctionnel à un an

Auteur(s) : Garrigues, Marion (1987-....)

Autre(s) responsabilité(s) : Allizard, Michel (1955-....) (Directeur de thèse)
Université de Bordeaux 2014-.... - Organisme de soutenance

Editeur, producteur : [Lieu de publication inconnu] : [éditeur inconnu], 2016

Description matérielle : 1 vol. (78 f.) : ill. en noir et en coul. ; 30 cm

Note sur l'exemplaire : Version électronique disponible au format pdf (BCSSA)

Note sur les bibliographies et les index : Bibliogr. f. 73-76 (85 réf.)

Note de thèses et écrits académiques : Thèse d'exercice Médecine générale 2016 Bordeaux

Résumé ou extrait : Introduction : Nous avons réalisé une étude unicentrique, rétrospective au sein des urgences de l'HIARP en 2013 pour évaluer le pronostic fonctionnel via le score de DASH (the Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand questionnaire) à un an d'une luxation gléno-humérale. Méthodes : 38 patients ont été inclus, âgés de plus de 18 ans, se présentant aux urgences de l'HIARP durant l'année 2013. 28 patients ont été réévalués par le questionnaire de DASH à un an de leur LGH. Résultats : Nous avons une population à 58% masculine, ayant pour moyenne d'âge 44,6 ans. Un tiers a un antécédent de LGH. La moitié des patients n'a pas de séquelles fonctionnelles, un quart a été opéré. Sont associés de façon significative à un score de DASH faible le jeune âge (moins de 40 ans), le sexe masculin et un immobilisation de moins de trois semaines (p