

La sarcoïdose dans les armées

Type de contenu : Texte

Type de médiation : sans médiation

Type de support : Volume

Titre(s) : La sarcoïdose dans les armées : étude cas-contrôle comparative des caractéristiques épidémiologiques, cliniques, biologiques, radiologiques et de l'impact psychologique (fatigue, anxiété-dépression, qualité de vie) entre une population de patients militaires et civils / Clara Ranc ; sous la direction de Frédéric Rivière

Auteur(s) : Ranc, Clara (1989-....)

Autre(s) responsabilité(s) : Rivière, Frédéric (1976-....) (Directeur de thèse)

Université Paris-Sud 1970-2019 - Organisme de soutenance

Université de Paris-Sud, Faculté de médecine Le Kremlin-Bicêtre, Val-de-Marne - Organisme de soutenance

Editeur, producteur : 2017

Description matérielle : 1 vol. (108 f.) ; 30 cm

Note sur l'exemplaire : (BCSSA) Version électronique disponible au format pdf

Note sur les bibliographies et les index : Bibliographie : 204 réf.

Note de thèses et écrits académiques : Thèse d'exercice Médecine Paris-Sud 2017

Résumé ou extrait : Introduction. La sarcoïdose est une granulomatose giganto-cellulaire sans nécrose caséuse d'étiologie peu connue. L'étiologie est encore mal comprise mais semble être multifactorielle, mêlant des éléments d'ordre inflammatoire, génétique, environnemental. De plus, de nombreux symptômes mal expliqués surviennent au cours de l'évolution de la sarcoïdose (fatigue chronique, anxiété, dépression, altération de la qualité de vie). Compte tenu de l'impact de ces symptômes sur la capacité opérationnelle de nos militaires, nous avons trouvé intéressant de les évaluer au sein d'une population de militaires. Objectifs. L'objectif principal de cette étude était de réaliser une analyse épidémiologique de la sarcoïdose au sein de l'Armée Française comparativement à une population de patients civils. Nous avons étudié des paramètres démographiques, radiologiques, biologiques respiratoires et thérapeutiques. L'objectif secondaire était de comparer, par le biais de questionnaires, des scores de fatigue, anxiété, dépression et qualité de vie entre 3 populations : militaires atteints de sarcoïdose, civils atteints de sarcoïdose et militaires sains (population contrôle). Matériels et Méthodes. Il s'agissait d'une étude descriptive rétrospective monocentrique comparant les paramètres épidémiologiques, cliniques, radiologiques, biologiques, thérapeutiques et scores à différents questionnaires (FAS, HAD, Saint

Georges, WHOQOL-BREF) entre 3 populations : militaires atteints de sarcoïdose, civils atteints de sarcoïdose et militaires sains. Les patients étaient tous majeurs, suivis à l'Hôpital d'Instruction des Armées Percy et présentant une sarcoïdose prouvée histologiquement. Les données recueillies étaient : démographiques (âge, sexe, IMC, statut tabagique, origine géographique, arme de service, OpEx), épidémiologiques, cliniques, radiologiques, biologiques et fonctionnelles (âge au diagnostic, stade radiologique, marqueurs biologiques d'activité, EFR, atteintes d'organes et traitements). Nous avons envoyé, par voie postale ou électronique, 4 questionnaires validés en français dans la sarcoïdose (FAS, HAD, Saint Georges, WHOQOL-BREF) à tous nos patients (civils et militaires) ainsi qu'à notre groupe militaire contrôle. Le risque alpha a été fixé à $p=0.05$. Les variables quantitatives ont été présentées sous la forme $m \pm SD$ et comparées avec un test T de Student. Le lien avec la catégorie a été évalué avec un χ^2 Résultats. Au total, 126 patients et 55 militaires sains ont été inclus. Nos patients militaires étaient plus jeunes ($49,5 \pm 11,5$ vs $53,3 \pm 15,1$ p