

Le syndrome d'épuisement professionnel chez les internes militaires de médecine générale de la promotion "ECN 2011 et reliquats"

Titre(s): Le syndrome d'épuisement professionnel chez les internes militaires de médecine générale de la promotion "ECN 2011 et reliquats" / Joachim Maloudi ; sous la direction de Patrick Clervoy et Philippe-Yves Simon

Auteur(s): Maloudi, Joachim (1988-....)

Autre(s) responsabilité(s): Clervoy, Patrick (1958-....) (Directeur de thèse)

Simon, Philippe-Yves (Directeur de thèse)

Aix-Marseille Université - Organisme de soutenance

Aix-Marseille Université, Faculté de médecine 2012- - Organisme de soutenance

Editeur, producteur: [S.l.] : [s.n.], 2014

Description matérielle: 1 vol. (179 f.) ; 30 cm

Titre traduit ajouté par le catalogueur: Burnout syndrome among "promotion ECN 2011 et reliquats" military general practitioners trainees eng

Note sur l'édition et l'histoire bibliographique: Thèse présentée sous la forme de thèse-article

Note sur les bibliographies et les index: Bibliographie : 68 réf.

Note de thèses et écrits académiques: Thèse d'exercice Médecine. DES de médecine générale 2014 Aix-Marseille

Résumé ou extrait: **OBJECTIFS**?: l'étude concerne l'évaluation de la prévalence du syndrome d'épuisement professionnel (SEP) chez des internes militaires de médecins générale. Secondairement, l'étude vise à évaluer la prévalence par catégories recensées (I.E. cursus, charge de travail, mode de vie, modalités de garde et de repos, état de santé, stress professionnel, estimation du sentiment de reconnaissance, etc.), afin d'identifier, les facteurs associés au SEP. **METHODES**?: Une étude multicentrique, transversale et descriptive a été réalisée de septembre à octobre 2014 dans les 9 hôpitaux d'Instruction des Armées (HIA) du Service de Santé des Armées (SSA), sur la base d'une enquête par sondage simple (données déclaratives). La prévalence du SEP a été évaluée grâce à un outil diagnostique, le "Maslach burnout inventory (MBI)", partie intégrante du questionnaire distribué. L'obtention d'un moins un score associé à un risque élevé pour l'une des trois dimensions du test, l'épuisement émotionnel (EE), la dépersonnalisation (DP) et l'accomplissement personnel (AP), est considérée comme pathologique. **RESULTATS**?: Sur 82 questionnaires adressés, 56 ont été analysés. 60,7?% des répondants (n=34) présentent au moins un score élevée (EE $\geq$ 30 [0-54]?; DP $\geq$ 12[0-30]?; AP