

Notice pdf - Céphalées aiguës aux urgences de l'Hôpital d'Inst_____

Type de contenu : Texte

Type de médiation : b

Type de support : Ressource dématérialisée

Titre(s) : Céphalées aiguës aux urgences de l'Hôpital d'Instruction des Armées Sainte-Anne : évaluation de la prise en charge initiale et du suivi post-urgence par le médecin généraliste / Godefroy Riant ; sous la direction d'Anthony Faivre

Est reproduit comme : Céphalées aiguës aux urgences de l'Hôpital d'instruction des armées Sainte-Anne évaluation de la prise en charge initiale et du suivi post-urgence par le médecin généraliste Godefroy Riant,... 2018 1 vol. (69 f.)

Auteur(s) : Riant, Godefroy (1990-....)

Autre(s) auteur(s) : Faivre, Anthony (1976-....)

Aix-Marseille Université 2012-....

Aix-Marseille Université Faculté de médecine 2012-2018

Production : 2018

Titre traduit ajouté par le catalogueur : Management of acute headaches at Sainte-Anne military teaching hospital from initial care at the emergency department to the follow-up by the general practitioner eng

Note(s) : Présentée sous la forme d'une thèse-article

Note sur le titre et les responsabilités : Titre provenant de l'écran-titre

Note de thèses et écrits académiques : Thèse d'exercice Médecine. Médecine générale Aix-Marseille 2018
Mémoire de DES Médecine. Médecine générale Aix-Marseille 2018

Résumé ou extrait : Introduction : l'enjeu de la prise en charge des céphalées aiguës aux urgences est d'identifier rapidement les céphalées symptomatiques avec un recours raisonné aux examens, tout en soulageant efficacement l'ensemble des patients. Matériels et méthodes Une étude observationnelle prospective à l'hôpital militaire de Toulon a inclus les patients se présentant pour céphalées aiguës pendant 6 mois. Les données épidémiologiques, cliniques, paracliniques, thérapeutiques ont été recueillies. Les patients ont été recontactés téléphoniquement à 3 mois pour évaluer leur devenir et leur niveau de satisfaction. Résultats 120 adultes ont été inclus d'âge moyen 44 ans, 38,2% avaient préalablement consulté leur médecin traitant. Les céphalées furent classées comme primaires dans 38,3% des cas, secondaires dans 31,7% et inclassables dans 30%. Un scanner cérébral fut réalisé dans 50% des cas. Le délai moyen de prise en charge était de 31 minutes, la durée moyenne totale de 289 minutes. Le

recours aux anti-inflammatoires et aux triptans était inférieur à 15%. 90% des patients regagnèrent directement leur domicile, la moitié adressée à leur médecin généraliste. 48 patients furent recontactés à 3 mois, deux tiers avaient été suivis en ambulatoire. Le taux de rechute était de 30%, un seul patient avait reconsulté aux urgences. Le niveau de satisfaction des patients était à 8,5/10. Conclusion : cette première évaluation de la prise en charge des céphalées aiguës aux urgences de l'hôpital militaire de Toulon est encourageante. Elle démontre néanmoins les progrès à réaliser dans la performance diagnostique et thérapeutique et la liaison avec le médecin traitant.

Configuration requise : un logiciel capable de lire un fichier au format : PDF

Sujet - Nom commun : Céphalée
Hôpitaux -- Services des urgences
Médecins généralistes

Forme, genre ou caractéristiques physiques : Thèses et écrits académiques

Adresse électronique et mode d'accès : <https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02005530>
https://www.gedissa.org/main/document/document.php?cidReq=BCSSA&id_session=0&gidReq=0&grad ebook=0&origin=&action=download&id=426