

## **Symptômes et consommation de soins des militaires français au retour d'une mission de courte durée**

Type de contenu : Texte

Type de médiation : sans médiation

Type de support : Volume

Titre(s) : Symptômes et consommation de soins des militaires français au retour d'une mission de courte durée / par Hubert Roger,... ; Sous la dir. du Médecin principal Lénaïck Ollivier

Auteur(s) : Roger, Hubert (1977-....)

Autre(s) auteur(s) : Ollivier, Lénaïck (1971-....)  
Université Bordeaux-II 1971-2013

Production : 2006

Description matérielle : 1 vol. (87 f.) ; 30 cm

Titre traduit ajouté par le catalogueur : Symptoms and consumption of care of the French soldiers to the return of mission of short duration eng

Note sur les bibliographies et les index : Bibliogr. f. 63-65

Note de thèses et écrits académiques : Thèse d'exercice Médecine générale Bordeaux 2 2006

Résumé ou extrait : Le Service de santé des armées françaises dispose d'une surveillance épidémiologique permettant de connaître l'état de santé des militaires. Le recours aux soins en milieu civil, en particulier lors des permissions après une mission, le prive de données nécessaires à l'optimisation des mesures de sélection et de prévention. Il existe peu d'études sur l'état de santé des militaires français ayant participé aux actuelles missions de maintien de la paix. Les objectifs de l'étude étaient d'évaluer l'état de santé des militaires dans le mois après un retour de mission, de mesurer les variations des symptômes déclarés avant et après la mission et de décrire leur prise en charge. Une enquête transversale a été réalisée auprès de militaires ayant participé à une mission en Afrique durant l'été 2005. Les données ont été recueillies par auto questionnaire anonyme administré en novembre 2005. Le questionnaire comportait des questions sur 44 symptômes, leur évolution par rapport à avant la mission et leur prise en charge. Sur les 420 questionnaires analysés, l'âge moyen était de 26,2 ans. Les sujets se plaignaient de dorsalgies (42,1 % des cas) et d'arthralgies (29,8 %). Ils déclaraient que leur personnalité avait changé depuis la mission dans 29,0 % des cas. Dans 11,8 % des cas, les sujets n'ont pas repris la vie en couple au retour de mission. Dans 55,6 % des cas, les sujets ont présenté au retour au moins un symptôme définissant l'état de stress post traumatique. Quel que soit le symptôme, plus de 50,0 % des sujets ont décrit une aggravation. Dans 32,1 % des cas, les sujets ont consulté au moins une fois un médecin dans le mois après le retour. Près de

60 % des sujets présentant un symptôme fonctionnel n'ont pas eu recours aux soins. La moitié des sujets déclarait que leur santé était moins bonne après le retour de mission. Informer les militaires sur les symptômes rencontrés au retour de mission les inciterait peut-être à consulter et permettrait donc une meilleure prise en charge.

Sujet - Collectivité : France Armée. -- Services de santé

Sujet - Nom commun : Maintien de la paix

État de stress post-traumatique

Militaires -- Psychologie

Névroses de guerre

Militaires -- Santé et hygiène

Forme, genre ou caractéristiques physiques : Thèses et écrits académiques