

Évaluation de la cicatrisation muqueuse induite par les thiopurines dans une cohorte multicentrique de patients traités pour une rectocolite hémorragique

Titre(s) : Évaluation de la cicatrisation muqueuse induite par les thiopurines dans une cohorte multicentrique de patients traités pour une rectocolite hémorragique / Caroline Klotz-Prieux ; sous la direction de Vered Abitbol

Auteur(s) : Klotz-Prieux, Caroline (1988-....)

Autre(s) responsabilité(s) : Abitbol, Vered (Directeur de thèse)
Université Paris Diderot - Paris 7 1970-2019 - Organisme de soutenance
Université Paris Diderot - Paris 7, UFR de médecine - Organisme de soutenance

Editeur, producteur : [S.l.] : [s.n.], 2015

Description matérielle : 1 vol. (49 f.) ; 30 cm

Titre traduit ajouté par le catalogueur : Mucosal healing induced by thiopurines in a multicentric cohort of ulcerative colitis patients eng

Note sur l'exemplaire : Version électronique disponible au format pdf (BCSSA)

Note sur les bibliographies et les index : Bibliogr. f. 43-46

Note sur le contenu : Contient un résumé en anglais

Note de thèses et écrits académiques : Thèse d'exercice Médecine. Gastro-entérologie et hépatologie 2015 Paris 7

Résumé ou extrait : Objectifs : Evaluer le taux de cicatrisation muqueuse endoscopique chez des patients atteints de rectocolite hémorragique (RCH) traités par thiopurines en monothérapie. Identifier des facteurs prédictifs de cicatrisation muqueuse sous thiopurines. Méthodes : Cinq centres hospitaliers ont participé à cette étude rétrospective en sélectionnant les patients à partir de leurs bases de données. Les patients inclus avaient une RCH traitée par thiopurines pendant plus de 6 mois en monothérapie. Ils étaient évalués par une endoscopie avant la mise en route du traitement et au moins six mois après. Les données cliniques, biologiques, endoscopiques et histologiques étaient recueillies avant traitement (T0), au moins 6 mois après (T1), et à la dernière consultation (T2). La cicatrisation muqueuse était définie par un score Mayo endoscopique = 2 ans et une colite aiguë grave avant traitement.

Sujet - Nom commun : Rectocolite hémorragique -- Thèses et écrits académiques
Thiopurines -- Efficacité -- Évaluation -- Thèses et écrits académiques
Muqueuse intestinale -- Lésions et blessures -- Chimiothérapie -- Évaluation -- Thèses et écrits académiques
Cicatrisation -- Thèses et écrits académiques