

Suivi à plus de 18 mois des sapeurs-pompiers victimes de stress aigu dans les suites de leur intervention lors des attentats de Paris le 13-11-2015

Type de contenu : Texte

Type de médiation : sans médiation

Type de support : Volume

Titre(s) : Suivi à plus de 18 mois des sapeurs-pompiers victimes de stress aigu dans les suites de leur intervention lors des attentats de Paris le 13-11-2015 / Hugues Perez ; sous la direction de Aurélie Eon

Auteur(s) : Perez, Hugues (1989-....)

Autre(s) auteur(s) : Éon-Andruétan, Aurélie (1981-....)

Université Paris-Sud 1970-2019

Université de Paris-Sud Faculté de médecine Le Kremlin-Bicêtre, Val-de-Marne

Production : 2018

Description matérielle : 1 vol. (129 f.) : ill. ; 30 cm

Note sur l'exemplaire : (BCSSA) Version électronique disponible au format pdf

Note sur les bibliographies et les index : Bibliographie : 103 réf.

Note de thèses et écrits académiques : Thèse d'exercice Médecine Paris-sud 2018

Résumé ou extrait : Introduction : suite aux attentats survenus à Paris le vendredi 13 novembre 2015, au cours desquels 430 pompiers de Paris sont intervenus, il a été nécessaire de mettre en place un suivi particulier des sauveteurs. L'objectif du travail est d'estimer chez ceux-ci, l'impact psycho-traumatique, les facteurs prédictifs, et l'efficacité du protocole de soin. Matériels et méthodes : l'enquête s'est déroulée de juin 2017 à septembre 2017. La population d'étude est définie par les pompiers du 1er groupement ayant présenté des signes de souffrance psychique ou de fragilité dans les suites immédiates de l'évènement. 62 personnes ont participé. Les données ont été recueillies par questionnaires biographiques et échelles d'évaluations psychiatriques. Résultats : 8,3 % de l'échantillon présente un score PCLS suffisamment élevé pour être considéré comme nécessitant une prise en charge psychiatrique ou psychothérapeutique même en l'absence d'ESPT clairement diagnostiqué, ce qui est légèrement inférieur aux données de la littérature. 13,3% des patients présente une symptomatologie dépressive, ce qui est semblable à la population générale dans ce type de situation. L'évaluation des scores d'émotions positives et négatives montre des émotions maîtrisées et avenantes à plus de 18 mois de l'évènement. Discussion : l'état de stress post-traumatique génère une grande souffrance psychique et peut avoir un retentissement très néfaste sur la trajectoire de vie de la personne qui en souffre. L'étude montre la confiance que portent les pompiers de Paris vis-à-vis du Service de Santé des Armées. Le protocole de soin et de suivi des

impliqués apparaît comme pertinent. Enfin, cette étude permet de rappeler l'intérêt d'une prise en charge médico-psychologique qui va du repérage du patient en souffrance jusqu'à son accompagnement dans la pathologie psychotraumatique.

Sujet - Collectivité : Paris Département. Brigade de sapeurs-pompiers.

Sujet - Nom commun : État de stress post-traumatique

Psychiatrie militaire

Terrorisme

Traumatisme psychique

Forme, genre ou caractéristiques physiques : Thèses et écrits académiques